

4 161
10/112 Cart
Thesis *Dorpat* *580423* *1881*
EXPERIMENTELLE STUDIEN

ÜBER
DEGENERATION UND REGENERATION
DER
CORNEALNERVEN.

2

INAUGURAL - DISSERTATION
ZUR ERLANGUNG DES GRADES
EINES
DOCTORS DER MEDICIN

VERFASST

UND MIT BEWILLIGUNG EINER HOCHVERORDNETEN MEDICINISCHEN FACULTÄT DER KAISERLICHEN UNIVERSITÄT ZU DORPAT ZUR ÖFFENTLICHEN VERTHEIDIGUNG BESTIMMT

VON

FRIEDRICH SCHULTZ.

ORDENTLICHE OPPONENTEN:

Doc. Dr. W. Koch. — Prof. Dr. Ed. Raehlmann. — Prof. Dr. F. A. Hoffmann.

DORPAT.

DRUCK VON H. LAAKMANN'S BUCH- UND STEINDRUCKEREI.
1881.

Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät.

Dorpat, den 5. September 1881.

Nr. 319.

Decan: F. Hoffmann.

1887

PIIS MANIBUS
ANNAE.

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Arthur Boettcher, sage ich für die mannigfache Anregung, die er mir während meiner Untersuchungen zu Teil werden liefs, meinen aufrichtigen, innig gefühlten Dank.

Dem Herrn L. Hirschhausen, stud. med., fühle ich mich für die sorgfältige Ausführung der dieser Arbeit beigefügten Zeichnungen zu Danke verpflichtet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Literatur über die Degeneration und Regeneration der Nervenfasern ist, wenn auch schon eine recht umfangreiche, so doch eine verhältnißmässig noch junge; wenn wir von älteren Autoren absehen, die einfach die Tatsache einer restitutio ad integrum zu constatiren bezweckten, so ist Waller¹ der erste, der die histiologischen Vorgänge bei der Degeneration und Regeneration markhaltiger Nervenfasern unter dem Mikroskop direct beobachtete. Um eine Degeneration hervorzurufen, trennte er durch Schnitt einen peripherischen markhaltigen Nerven in seinem Verlaufe zwischen Centralorgan und Endausbreitung. Diese nach ihm benannte Methode wurde an demselben Versuchsobjecte auch von der Mehrzahl seiner Nachfolger geübt. In der Folgezeit wurde sowol die Wallersche Methode modificirt, als auch andere Methoden, wie Aetzen, Unterbinden, Quetschen, Eintauchen in verschiedene Flüssigkeiten eingeführt; das Versuchsobject blieb dasselbe. Es ist selbstverständlich, daß die so sehr in die Augen springenden Veränderungen des degenerirenden Markes die Aufmerksamkeit der Autoren anfangs besonders auf sich ziehen mußten, zumal da zu der Zeit es noch lange nicht fest stand, daß der Axencylinder der wesentlichste und Hauptbestandteil der Nervenfasern ist. Die Unzulänglichkeit der Untersuchungs- speciell der Färbemittel trugen das ihrige dazu bei, die Resultate unvollkommen erscheinen zu lassen. Durch Max Schultze², Waldeyer³, besonders aber durch Ranvier⁴

wurde die Technik bedeutend vervollkommenet, und wenn trotzdem die Resultate noch nicht die gewünschte Einigkeit darbieten, so trägt die Schuld daran gewiß zum großen Teil das complicirte Versuchsobject, die markhaltige Nervenfasern, die ihren Axencylinder, auf dessen Verhalten es doch hauptsächlich ankommt, erst nach mehr weniger eingreifenden Präparationsmethoden sehen läßt, wodurch natürlich die Reinheit der Beobachtung getrübt werden mußte. Es lag daher nahe, an marklosen Nervenfasern zu experimentiren und zwar dort, wo solche sich als Fortsetzungen markhaltiger d. h. als dieselben, nicht mehr mit Mark bekleideten Axencylinder präsentiren. Solche finden sich in größerer Menge in der Nasenschleimhaut als Endausbreitung des Olfactorius, und in der Cornea als Endausbreitung des nn. ciliares aus dem Trigeminus. An den ersteren haben Schiff und Colasanti nach Tizzoni⁵ mit negativem Resultate experimentirt, was Tizzoni der Specificität der betreffenden Fasern zuschreibt, wobei jedoch auch die Unzugänglichkeit des zu untersuchenden Terrains mitgespielt haben mag. Positive Resultate erzielte Tizzoni, der im Laboratorium Bizzozzero's arbeitete, bei seinen Experimenten an den Nerven der Cornea, die auch für diese Frage ihren Ruf als »klassisches Untersuchungsobject« bewahrheitete. Nachdem ich die Originalarbeit Tizzoni's erhalten hatte, erfah ich aus ihr mit lebhafter Genugthuung, daß unsere Resultate in den wesentlichsten Punkten übereinstimmten. Auf Abweichungen in der Deutung der erhaltenen Bilder werde ich im Verlaufe der Arbeit zu sprechen kommen *).

*) Das Referat Bizzozzero's über die Arbeit Tizzoni's in den Jahresberichten von Hoffmann und Schwalbe für 1878 gelangte in meine Hände, da meine Untersuchungen ihrem Abschluss nahe waren, die Originalarbeit erst einige Wochen später. Die sonstigen Arbeiten über Nervenregeneration citiren zum großen Teil die vorläufige Mitteilung Tizzoni's im Centralblatt f. d. med. Wiss. für 1878, in welchen der Cornealnerven mit keinem Worte Erwähnung geschieht. Der Plan zur Arbeit ist also selbständig entworfen, die Untersuchungsmethode und das Untersuchungsthier selbständig gewählt worden. Warum ich, falls überhaupt ich an Cornealnerven experimentiren wollte, genau denselben Weg einschlagen mußte, den Tizzoni gegangen war, wird im weiteren Verlaufe der Darstellung klar werden.

Nachdem im October 1880 Herr Profeffor Arthur Boettcher mir den Vorfchlag gemacht hatte, Unterfuchungen über Degeneration und Regeneration der Nerven an der Frofchcornea anzuftellen, und zu dem Zwecke die, auf dem in Folge der Aetzung an der Aetzftelle fih bildenden, vollkommen hellen, durchfichtigen, fowohl der Zellen, als auch der Nerven baren Terrain, an den Nervenftümpfen fih abfpielenden Vorgänge zu beobachten, befchloß ich, eine beliebige Anzahl von Frofchhornhäuten in einer Sitzung zu ätzen, fie in beftimmten Zwischenräumen einer Unterfuchung zu unterwerfen, um fo, die auf diefe Weife fih ergebenden, aufeinander folgenden Bilder einer Serie combinirend, eine Vorftellung über den fraglichen Proceß mir zu bilden.

Bevor ich nun zur Darlegung der durch die Aetzung erzeugten Bilder fchreite, will ich eine Befprechung des Unterfuchungsobjectes, fo weit es für die vorliegende Arbeit in Frage kommt, fo wie der bei der Unterfuchung angewandten Hülfsmittel vorausfchicken.

Auf eine Zufammenftellung eines Literaturverzeichniffes glaube ich verzichten zu dürfen: folche find bereits geliefert worden 1) für den Bau der Cornea von Waldeyer, Handbuch der gefammten Augenheilkunde von Graefe und Saemifch Bd. I. 2) für die Vorgänge in ihr nach centraler Aetzung von Fuchs. Ueber traumatifche Keratitis. Virchow's Archiv Bd. 66. 3) für die Nerven in der Cornea von Izquierdo, Beiträge zur Kenntnifs der Endigung der fenfiblen Nerven. Inaug. Diff. Strafsburg 1879. 4) für den Bau der peripherifchen Nerven von Kuhnt, die peripherifche markhaltige Nervenfafer. M. Schultzes Archiv Bd. XIII., endlich 5) für Degeneration und Regeneration der Nerven von Korybutt-Daszkiewicz. Ueber die Degeneration und Regeneration der markhaltigen Nerven nach traumatifchen Laefionen. Inaug. Diss. Strafsburg 1878.

I. Capitel.

Die Cornea des Frosches und ihre Nerven.

Fig. I.

Die flach ausgebreitete Hornhaut eines ausgewachsenen Frosches *) misst im Längendurchmesser, von rechts nach links, ungefähr 6–7 mm., im Höhendurchmesser, von oben nach unten etwas weniger. Die Dicke, von vorn nach hinten beträgt 0,1 mm. **) bei kleinen Fröschen noch weniger. Der Aufbau der Cornea geschieht durch dieselben Schichten, die wir auch bei den übrigen Wirbelthieren kennen, vorderes mehrschichtiges Epithel, bei dem Frosche fast so stark als das übrige Hornhautgewebe, eigentliches Hornhautgewebe mit vorderer Basalmembran, Descemetische Haut, hinteres einschichtiges Plattenepithel. Von diesen Schichten interessiert uns zumeist das eigentliche Hornhautgewebe, da in ihm die gröberen Nervenstämmе, auf deren Beobachtung es bei vorliegender Untersuchung vorherrschend ankommt, verlaufen. *Waldeyer* ⁶, dessen Darstellung ich hauptsächlich folge, unterscheidet in der *Substantia propria corneae* eine fibrilläre und interfibrilläre Grundsubstanz, (Kittsubstanz). Die einzelnen parallel zu einanderliegenden Fibrillen werden durch die interfibrilläre Kittsubstanz zu Fascikeln,

*) Ich experimentirte ausschliesslich an Exemplaren der *Rana temporaria*, wie sie in hiesiger Gegend vorkommen.

**) Die im Verlaufe der Arbeit angeführten mikroskopischen Maasse habe ich bestimmt, indem ich das durch ein möglichst starkes System vergrösserte Bild durch die camera lucida auf einen für das betreffende System durch Objectivmikrometer hergestellten Maassstab projicirte.

letztere ebenfalls parallel nebeneinander gelagert, durch dieselbe, hier interfascikuläre, Kittsubstanz zu Lamellen verbunden, welche hinter einander geschichtet wiederum, gleichsam als Abschnitte concentrischer Kugeloberflächen die, hier interlamelläre, Kittsubstanz mit einander vereinigt. In diese Kittsubstanz nun ist das Saftcanalsystem der Cornea eingegraben, die Saftlücken mit ihren Ausläufern, den Saftcanälen, letztere nicht nur in der interlamellären, sondern auch in der interfascikulären und — wie Waldeyer nicht bezweifelt — auch in der interfibrillären Kittsubstanz. Alle Saftcanäle stehen mit einander in Verbindung, indem nicht nur Interlamellarlücken von vorn nach hinten, sondern auch die Interfascikularlücken nach allen Richtungen hin mit einander anastomosiren; dadurch, daß die Fascikel einer jeden Lamelle so angeordnet sind, daß sie mit denen der benachbarten Lamelle einen beinahe rechten Winkel bilden, entstehen sowol gitterartige Bilder, als auch bayonettförmige Zeichnungen, letztere, wenn die Anastomose eines Saftcanälchens mit einem ihm parallel verlaufenden durch einen in einer darüber oder darunter liegenden Interfascikularlücke verlaufenden Verbindungs canal sichtbar wird, was natürlich am häufigsten in einer Interlamellarlücke, wo diese Canäle an einander stoßen, zu Stande kommt, und dann bei derselben Einstellung des Mikroskops übersehen wird. Die von His⁷ und Leber⁸ den Saftcanälen zugeschriebene eigne Wandung wird von Waldeyer geleugnet; sie sind von einem durch Silberbehandlung zur Erscheinung kommenden Endothel ausgekleidet.

Die so eben gelieferte Beschreibung der Saftcanäle paßt genau auch für die Nervencanäle, die durch zahlreiche Anastomosen mit ersteren zusammenhängen, und so ein einheitliches Canalsystem für den die Hornhaut ernährenden Saft, die Lymphe, bilden. Selbstverständlich haben die Nervencanäle je nach der Breite der in ihnen verlaufenden Nervenstämmen ein verschiedenes Lumen, welches von ihnen jedoch nicht immer vollständig ausgefüllt wird, denn oft sieht man parallel den Nerven einen Contour, der einen Raum

begrenzt, in welchem bei derselben Einstellung des Mikroskops weder Hornhautzellen, noch deren Ausläufer vorkommen, oft jedoch von den Nervenstämmen sich abtrennende und nach kurzem Verlauf sich wieder anlegende, feine, lineäre Fasern.

Die Nervenstämmen verlaufen in den hintersten Schichten der Hornhaut, so daß, bei einem Versuch, die Membrana Descémeti abzulösen, die Nervenstämmchen gewöhnlich mit ihr zusammen vom übrigen Cornealgewebe abgetrennt werden. Gleich nach ihrem Eintritt in die Cornealsubstanz haben die mehr weniger starken Nervenstämmchen einen radiären Verlauf, teilen sich sehr bald dichotomisch, auch trichotomisch, ersteres, indem die beiden aus der Teilung hervorgegangenen Aeste unter leichtem, zum Cornealrande offenen Bogen auseinander gehen, um dann bald mit eben solchen Aesten aus den benachbarten Stämmchen zu anastomosiren; auf der Höhe des also gebildeten Bogens werden wiederum centralwärts gehende Zweige abgegeben, die entweder nochmals die eben beschriebene Bogenbildung eingehen, um dann zum Centrum abgehende, mit den, dem gegenüberliegenden Cornealrande entstammenden, Zweigchen zu verschmelzen, oder, was das häufigere ist, direct die eben besprochene Anastomose zu bilden. Diese kommt zu Stande, indem gewöhnlich vier Zweigchen in einem Knotenpunkt unter fast genau rechten Winkeln aneinander stoßen und ihre Fasern unter einander austauschen, indem aus jedem der vier Nerven Fasern zu einem jedem der drei übrigen Nerven sich begeben. Wenn fünf oder mehr Fasern sich an der centralen Anastomose beteiligen, so sieht man oft ein mehr weniger weites Viereck, dessen Seiten von anastomosirenden, seitwärts abgebogenen Zweigchen der centralwärts ziehenden Nervenzweige gebildet sind. Diese centrale Anastomose liegt durchaus nicht immer genau im mathematischen Centrum der Cornea, sondern gewöhnlich näher demjenigen Rande der Hornhaut, an welchem die schwächeren Nervenstämmen eintreten. Häufig sieht man ähnliche, Xförmige Anastomosen, oder klei-

nere, von stärkeren Nervenzweigen umschlossene Felder der Cornea, an deren Bildung Verzweigungen nur eines Nervenstämmchens concurriren, ohne Beteiligung von Zweigen benachbarter oder gar gegenüberliegender Nervenstämmchen. Von den Xförmigen Anaftomosen unterscheiden sich leicht die trichotomischen Theilungen, bei welchen der eine Ast in der Richtung des Nervenstämmchens weiter verläuft, die beiden anderen aber, wie bei der dichotomischen Theilung, unter einem zum Cornealrande offenen Bogen abgehen, so daß zwischen den Aesten spitze Winkel liegen; bei der Xförmigen Anaftomose waren die Winkel nahezu rechte. — Durch ein Auseinanderweichen des Mittelfstückes nehmen die Xförmigen Anaftomosen ein Hförmiges Aussehen an. Nicht alle sich abtheilenden Nervenzweige gehen jedoch — auf die eine oder die andere Weise — Anaftomosen ein, sondern es giebt auch solche, die nach kurzem Verlauf plötzlich aus dem Gesichtsfelde verschwinden, indem sie, steil umbiegend, der vorderen Fläche der Cornea zuziehen.

Dieses ist das Schema, nach welchem die Verteilung der breiteren, nicht unter $3\ \mu$ Breite haltenden, Cornealnerven vor sich geht. Es giebt natürlich zahlreiche Ausnahmen; von der Verschiebung der centralen Anaftomosenbildungen nach irgend einer Seite habe ich schon gesprochen; es kommt vor, daß sich ein Nervenstamm erst in größerer Entfernung vom Hornhautrande theilt, oder er verläuft ungeteilt, vielleicht nur einzelne Zweigchen abgebend, direct bis zur centralen Anaftomose — feststehend jedoch für eine jede Cornea ist die endliche Anaftomosenbildung der größeren Verzweigung verschiedener Nervenstämmchen unter einander, und ein mehr weniger geschwungener, bogenförmiger Verlauf. Durch diese, bei einer Vergrößerung von Hrt. Oc. 3. Syft. 4. sehr deutlich sichtbaren Nerven wird die Cornea in Felder geteilt von sehr verschiedener Größe und Gestalt; zum Centrum hin werden diese Felder kleiner. Es dürfte sich wol keines finden, in welches man einen Kreis von 1 mm. hineinbeschreiben könnte, ohne durch

die Kreislinie mindestens einen der besagten Nerven zu schneiden. Die gewöhnlichen Breitendurchmesser dieser Felder betragen 0,5—0,8 mm.

Innerhalb dieser Felder sieht man den Verlauf und die Verteilung der feineren Nervenfasern, und zwar sowol in derselben Gesichtsebene, in der die gröberen Netze verlaufen, als auch in einer der der M. Descémets noch näher liegenden Interamellarlücken. Es wiederholt sich da im Ganzen dasselbe Bild: Abgang feinerer Zweigchen von den gröberen, Teilung derselben, Anaftomosen, abermalige Teilung, bis endlich die feinen, nicht mehr meßbaren linear erscheinenden Fasern in feinste, variköse Primitivfibrillen ausstrahlen; auch die letzteren anaftomosiren häufig miteinander — sie kreuzen sich, legen sich aneinander, um dann sich wieder zu teilen. Ob sie mit einander verschmelzen, lasse ich dahingestellt sein. Jedenfalls beobachtet man einen ähnlichen Vorgang auch an den ursprünglichen Nervenstämmchen und deren Verzweigungen: die einzelnen breiteren Nervenfasern, aus denen diese zusammengesetzt erscheinen, sieht man häufig innerhalb der Contouren des Nervenstämmchens sich teilen, die Teile sich an die benachbarten, oder auch, diese überspringend, an eine weiter gelegene Faser anlegen, so daß auch mit Hrtn. Syst. 9 kein Zwischenraum zwischen ihnen zu sehen ist; dann wiederholt sich dasselbe Spiel, wieder Teilung und Vereinigung, so daß eine Maschenbildung zu Stande kommt. Ferner sieht man oft seitlich von den stärkeren, aus immerhin noch meßbaren Fasern bestehenden, Nerven sich feine unmeßbare Fasern seitlich abzweigen, die entweder sofort sich in die Cornea begeben, um dort sich weiter zu verzweigen, zu anaftomosiren etc. oder nach kurzem Verlaufe wieder sich an den Nerven anlegen, um mit dem Verlaufe irgend einer Faser des stärkeren Nervenbündels zu verschmelzen. Besonders häufig ist diese Art des Verlaufs an den Kreuzungsstellen und Knotenpunkten, sodafs jene eigentlich scharfwinkligen Figuren dadurch zu äußerst zierlichen Vierecken resp. Dreiecken mit bogenförmig sanft eingedrückten Seiten werden.

Nach der allgemeinen Beschreibung treten die Nervenfasern als markhaltige, zu Stämmchen geordnet, aus der Sclera in die Cornea ein. Bald nach ihrem Eintritt verlieren sie ihr Mark, jedenfalls vor der ersten Teilung. Das Mark ist nur durch einen besonderen Glanz der einzelnen Faser kenntlich, sowol an der frischen Cornea, als auch an der mit Goldchlorid behandelten. Nicht alle Fasern sind bei ihrem Eintritt markhaltig, sowol gesondert, als auch unter markhaltige gemischt sieht man auch marklose Fasern am Scleralrande eintreten. Im Gegensatz zu obiger Darstellung des Verhaltens des Markes stehen nur Beale⁹, Ciaccio¹⁰ und Waldeyer⁶; dieser sagt: »Auch an den feinsten Fäserchen findet sich vielfach noch eine dünne Scheide einer zarten granulirten Substanz, — welche man als Fortsetzung der Markscheide ansehen muß, wenn sie auch nicht mehr den Character des Markes einer gröberen, doppelcontourirten Faser an sich trägt. An den aus mehreren Axenfibrillen, bez. Axencylindern gebildeten Stämmen ist diese Substanz als feinkörnige interfibrilläre Masse zu erkennen.« Diese feinkörnige interfibrilläre Masse ist zwischen den einzelnen Axencylindern recht häufig sichtbar; warum sie aber als Fortsetzung der Markscheide angesehen werden »muß«, ist mir nicht verständlich geworden; sollte sie nicht viel ungezwungener als eine die Axencylinder aneinander bindende Kittmasse gedeutet werden können? Auch an den feinsten Fasern stehe ich nicht an, dort wo sie sich zeigt, sie als Kittmasse zu deuten, wie ja auch von Hoyer¹¹ (pag. 228) angenommen wird. Jedenfalls habe ich eine solche Scheide nie als eine continuirliche gesehen, nur hie und da fand ich zuweilen kleine Tüpfelchen dieser feinkörnigen Masse den feinsten Nervenfasern anhaftend. Andererseits leugnen Beale⁹ (p. 104) und Ciaccio^{10*)} (p. 85) durchaus das Vorhandensein irgend einer Spur von Markscheide.

*) Henle, Systematische Anatomie Bd. II. läßt Ciaccio behaupten, die Cornealnerven seien in ihrem ganzen Verlaufe dunkelrandig.

Nach meinen Untersuchungen ergibt eine Behandlung der Cornea in toto mit Ueberosmiumsäure (Lösung von 1 %) keine Spur der charakteristischen Myelinfärbung, selbst nach einer Einwirkungsdauer von 3 Tagen. An frischen Hornhäuten ist mir ein größerer Glanz oder eine dunklere Randfärbung der eintretenden Nervenfasern nicht ersichtlich gewesen. Zur Controle angestellte Goldfärbungen des Froschmesenteriums ergaben mir an markhaltigen Fasern ganz andere Bilder, als ich sie je in der Cornea gesehen, während gutgefärbte marklose Fasern des Mesenteriums durchaus den in den Nerven der Cornea verlaufenden Fasern gleichen. Ich kann daher auch die Cornealnerven nur als vollständig marklose auffassen.

Ich wende mich nun zur Besprechung der in den normalen Cornealnerven zur Beobachtung kommenden Kerne. Diese treten in Begleitung der Nervenfasern, diesen scheinbar dicht anliegend, in sehr wechselnder Häufigkeit auf, so lange die Faser noch eine meßbare Breite hat. An den feinen und feinsten Nervenfasern fehlen sie regelmäÙig. Ihre Form ist ein stark in die Länge gezogenes Oval, das Verhältniß von Breitendurchmesser zu Längendurchmesser ist 1 : 5—7, es finden sich aber auch Kerne, in denen das Verhältniß 1 : 10—16 ist. Innerhalb dieser Grenzen giebt es alle möglichen Schwankungen des Längendurchmessers, während der Breitendurchmesser ziemlich constant ($= 2,5 - 3,1 \mu$) ist. Ausser diesen kommen noch Kerne von dreieckiger, oder unregelmäÙig polygonaler Gestalt vor, und zwar gruppenweise in den Knoten- und Kreuzungspunkten der gröÙeren Nervenstämmchen, einzeln in den Knotenpunkten der lineären Nervenfasern. Ihre Durchmesser etwa $3,5 \mu$. Alle sind sehr scharf contourirt, fein granulirt und erscheinen im goldgefärbten Präparat dunkelviolett, die dreieckigen etwas heller. Das länglich ausgezogene Oval der Kerne wird häufig dadurch modificirt, daÙ die Längsseiten einander parallel verlaufen, so daÙ eine Stäbchenform entsteht, oder daÙ sie an den Enden der Längsachsen in Spitzen ausgezogen sind, so

dafs sie spindelförmig erscheinen, oder sie nehmen durch Einbuchtungen eine nierenförmige oder bisquitförmige Gestalt an. Durchaus constant an ihnen ist, dafs ihre Längsaxe parallel der Faserung des betreffenden Nerven ist. Auffallend ist die wechselnde Häufigkeit der Kerne: während an einem Nervenabschnitt von bestimmter Länge man beispielsweise 16—18 Kerne zählt, hat in einer anderen Cornea ein gleich breites und langes Stück eines Nerven deren etwa zwei. Einen Grund hierfür habe ich nicht finden können, da die Nerven in ihrem sonstigen Verhalten keine Unterschiede zeigten. Solche Hornhäute, in denen die Kerne so spärlich auftreten, sind übrigens sehr selten. — Die Zahl der Kerne an den Nerven nimmt mit ihrem Fortschreiten zur Mitte der Hornhaut ab, und zwar zuerst im geraden Verhältnifs zur Breite des Nerven, später bedeutend rascher, so dafs ein Stück eines gleich breit bleibenden Nerven weiter zum Centrum der Hornhaut oft keine Kerne zeigt, während ein gleich langer Abschnitt desselben Nerven näher zur Peripherie desselben noch 1—2 Kerne aufweist. Dieses könnte mit dem Verhalten der die Kerne führenden Membran, der Nervenscheide, zusammenhängen, die vielleicht nicht mehr so weit reicht, oder nur noch bruchstückweise — als Häutchenzellen — vorhanden ist. Aber haben die Cornealnerven überhaupt eine Scheide, und wenn sie eine haben, als was ist dieselbe aufzufassen?

Die in der Literatur über die Cornealnerven gegebenen Aufschlüsse sind leider sehr spärlich: His ⁷, Langhans ¹², Ciaccio ¹⁰, Lawdowski ¹³, Thanhofer ¹⁴ sprechen nur von kernführenden Nervenfasern, ohne einer Scheide zu erwähnen, Hoyer ¹¹ hält die Kerne für einen Bestandteil der die Fibrillen zusammenhaltenden Neuroglia, Waldeyer ⁶ läfst die Nervenfasern nach Einbusse des Markes als nackte Axencylinder weiterziehen; während Kuehne ¹⁵ sie einer Scheide angehören läfst, von der er nicht entscheidet, ob es die Schwannsche Scheide, oder ein einfaches Rohr mit kernhaltiger Wand sei, erklären sich Henle ¹⁶,

Cohnheim¹⁷, Köl liker¹⁸, Schweiger-Seidel¹⁹, Rollet²⁰ und Klein²¹ für eine kernhaltige Scheide.

Nach Cohnheim deutet, obgleich eine Scheide an den marklosen Fasern nicht mehr zu constatiren ist, dennoch die unregelmäßige Verteilung der Kerne und ihre Aehnlichkeit mit denen in den Hauptstämmen beim Eintritt in die Cornea auf die Existenz einer solchen, wenn auch die Gegenwart von Kernen, zumal an marklosen Fasern, noch kein sicherer Beweis für die Existenz einer Scheide ist.

Rollet läßt die Scheiden sowohl an den markhaltigen, als an den marklosen Fasern durch längliche Kerne angedeutet sein, macht aber auch den Vorbehalt, daß die an den Bündeln markloser Fasern vereinzelt sich anschließenden längsovalen Kerne nicht mit Bestimmtheit auf eine zusammenhängende Scheide bezogen werden können. Während diese beiden Forscher sich mit Vorbehalt für eine Scheide aussprechen, erklären sich die übrigen vier unbedingt für die Existenz derselben. Köl liker will sie sogar im Cornealepithel nachgewiesen haben. M. Schultze endlich spricht die Schwannsche Scheide nur den aus den Cornealnerven hervorgehenden letzten Einzelfibrillen ab.

Noch spärlicher wird die Ausbeute, wenn man die Literatur über die marklosen Fasern, insofern sie als Endausbreitungen der markhaltigen Nervenfasern auftreten, durchforstet; so reichhaltig die Literatur des peripherischen Nervensystems über die markhaltige Nervenfafer und über ihre Endorgane ist, — für das Verbindungsglied beider, welches so oft als marklose Fafer auftritt, scheinen die Forscher sich nicht interessirt zu haben. Man findet wol Hinweise auf diese bei der Beschreibung der marklosen Fasern, welche neben den markhaltigen in den peripherischen Nervenbahnen, und im N. sympathicus verlaufen, eine Identität des Baues beider Arten von marklosen Fasern ist jedoch trotz der vielfachen Uebereinstimmungen nicht behauptet worden, so daß es zweifelhaft ist, ob die Beschreibung der marklosen (fog. organischen,

Fasern auch ohne weiteres für die marklose Endausbreitung markhaltiger Nerven paßt. Zudem herrschte bis zu den Arbeiten von Key und Retzius²² ein unbeschreiblicher Wirrwarr in der neurologischen Nomenclatur: die Bezeichnungen Nervenhülle, Nervenscheide, Schwannsche Scheide, Neurilemm, Perineurium, Primitivscheide werden durch einandergeworfen; man ist nie sicher, ob unter einer der obigen Benennungen die Schwannsche Scheide sensu strictiori, das diese umgebende Bindegewebe, oder beides zusammen gemeint ist. So beschreibt M. Schultze^{2 e} die Schwannsche Scheide — die er mit dem Neurilemm identificirt — als eine »bindegewebige Hülle«, die »entweder eine structurlose, glashelle, zarte Haut ist, — — oder aus mehrfachen Lagen fibrillären Bindegewebes« besteht. Die Auffassung der Schwannschen Scheide als Bindegewebe ist überhaupt eine sehr verbreitete; neben anderen vertreten diese Ansicht Mauthner²² (p. 62), Ewald und Kühne²³; gegen dieselbe erklärte sich Kölliker¹⁸, der den Nervenhiillen den bindegewebigen Charakter absprach, da ihnen das Charakteristische des Bindegewebes, das Bindegewebskörperchen, fehle. Auch Key und Retzius, gestützt auf ihre Injectionsversuche, durch welche die Schwannsche Scheide nie von der Markscheide getrennt werden konnte, sprechen ihr den bindegewebigen Charakter ab, und halten sie für mehr speciell der Nervenfafer angehörig.

Aus der speciell neurologischen Literatur habe ich nun folgende Angaben, welche das Verhältniß der Kerne der marklosen Nervenfasern zu den, letztere etwa bekleidenden, Scheiden behandeln, anzuführen:

Reifsnier²⁴ constatirte als Characteristicum der peripherischen Nervenfafer im Allgemeinen das Vorkommen von in den Primitivscheiden liegenden spindelförmigen und länglich-runden Kernen. Aehnliche Resultate erhält M. Schultze^{2 u} bei der Untersuchung der die Endausbreitung des N. olfactorius bildenden blaffen Fasern, die er mit den marklosen identificirt:

wo er Kerne fand, gehörten sie den Scheiden an; aus der Abwesenheit der Kerne an den Primitivfasern schließt er auf das Fehlen einer Scheide. Indem derselbe ²⁰ von den marklosen Fasern der peripherischen Nerven spricht, beschreibt er diese als aus dickeren oder dünneren Bündeln von Primitivfibrillen, nach Art der Axencylinder bestehend, durch eine kernhaltige Scheide zusammengehalten. Auch Waldeyer ³ läßt die grauen Fasern der Wirbelthiere von einer zarten kernhaltigen Scheide umgeben sein. Key und Retzius ²² rechnen die myelinfreien Fasern der cerebrospinalen Nerven und des Sympathicus zu derselben Art histiologischer Elemente, finden aber einen Unterschied in dem Verhalten der Kerne; von den ersteren sagen sie (p. 86): »Obwohl man sonst sehr wenige Spuren einer die Fasern bekleidenden (Schwannschen) Scheide wahrzunehmen vermag, spricht doch das Vorhandensein dieser Kerne stark für die Existenz einer solchen.« Von den marklosen Sympathicusfasern dagegen heißt es p. 160; »Von einer jede Faser umgebenden Scheide sehen wir nie bestimmte Spuren. Nie war an unbeschädigten Fasern eine solche Scheide wahrzunehmen, und an zerrissenen sehen wir keine Fetzen derselben haften. Die einzige Bildung, welche für das Vorhandensein einer Scheide spräche, sind die — Kerne. — An solchen Präparaten, wo die verschiedenen Fasern mehr von einander getrennt sind, sieht man, daß die Kerne — den einzelnen Fasern, nicht aber einer für mehrere Fasern gemeinsamen Scheide angehören.« Trotzdem heißt es auf der folgenden Seite, wo der Beweis für die nervöse Natur der kernführenden Fasern erbracht wird: — »Endlich ähneln sie den Nervenfasern, in welche an manchen Endausbreitungen die Markfasern nach Abgabe ihrer Myelinscheide auslaufen. Daß sie übrigens den marklosen Fasern der cerebrospinalen Nerven entsprechen, wurde schon bei diesen hervorgehoben.« Die von Key und Retzius im Capitel: »der Bau der sympathischen Nerven« citirten Forscher sprechen nur von kernführenden Fasern, ohne eine dazugehörige Membran

zu erwähnen, nur Axmann (p. 154) constatirt eine mit nicht wahrnehmbarer Structur versehene und nur zuweilen mit platten Kernen besetzte, dehnbare Haut, die er cylinderförmige Röhre, Scheide, Begrenzungs-haut nennt, Robin (p. 157) kennt Nervenfaserscheiden, Frey (p. 158) ein kernführendes Neurilemm.

Mir ist es nicht gelungen, eine die Cornealnervenfasern einschließende Membran zu sehen, oder gar darzustellen. Wenn ich mich dennoch — mit der Mehrzahl der Forscher, die ihr Augenmerk auf eine Hülle gelenkt haben, — für eine solche entscheide, so geschieht es erstens aus denselben Gründen, auf welche gestützt obige Autoren sich für die Existenz derselben erklären, dann aber auch — wie ich hier vorausgreifend erklären will — weil ich während des Degenerationsprocesses in den Nervencanälen Bilder erhielt, die nur auf einen nach Schwund des Axencylinders persistirende Membran zu beziehen waren.

Diese Membran nun fasse ich als Schwannsche Scheide auf, weil eben keine andere, bindegewebige Hülle, auch nicht die Key und Retzius'sche Fibrillenscheide (p. 101), die Nervenfasern so dicht umgibt, daß nicht zwischen beiden ein Zwischenraum bliebe und dadurch die Hülle zur Anschauung gebracht werden könnte. Die an anderen Nervenfasern beschriebenen, als Lymphscheide nachgewiesenen Bindegewebshüllen dürften an den Cornealnerven wohl einzig durch die bindegewebige Grundsubstanz der Hornhaut geliefert werden.

Der Zweck dieses Capitels konnte natürlich nicht eine detaillirte histiologische Beschreibung der Cornealnerven und des Verhaltens zu ihrer Umgebung sein; es kam mir vielmehr darauf an, bei der so wenig einheitlichen Terminologie, in vorliegendem Capitel diejenigen Begriffe festzustellen, die ich mir von den histiologischen Elementen und den physiologischen Vorgängen in der Cornea, sowie den sie bezeichnenden Benennungen gebildet habe; dadurch mögen die vielfachen Lücken in obiger Darstellung erklärt sein.

2. Capitel.

Untersuchungsplan und Untersuchungsmethode

Nachdem sich mir die Aufgabe gestellt hatte, die Vorgänge der Degeneration und Regeneration markloser Nerven zu beobachten, mußte ein Untersuchungsobject gewählt werden, welches 1) marklose Nerven in genügender Quantität darbot, 2) dem Eingriffe, der eine Störung des normalen Verhaltens der Nerven hervorzurufen bestimmt war, sowie der Beobachtung der auf den Eingriff erfolgenden Veränderungen keine allzugroßen technischen Schwierigkeiten entgegenstellte, 3) stets in hinreichender Anzahl zu beschaffen war, um die Untersuchung einer größeren Reihe zeitlich auf einander folgender Bilder desselben Vorganges an demselben Organ derselben Thierspecies zu ermöglichen. Marklose Fasern in größerer Anzahl finden sich im Sympathicus und dessen Aesten, und in den Endausbreitungen der markhaltigen Nerven, besonders des Olfactorius, des Acusticus, und der die Cornea versorgenden nervi ciliares anteriores. Von einer Inangriffnahme des Sympathicus mußte abgesehen werden, da eine solche einerseits tiefere Störungen in den Functionen des Organismus hervorrufen mußte, und dadurch auf die normale Entwicklung des Vorganges einen störenden Einfluss haben konnte, andererseits die Beobachtung eine sehr schwierige gewesen wäre; dasselbe gilt von der in der Nasenschleimhaut sich ausbreitenden Olfactoriusfasern. Dafs an den marklosen Endausbreitungen des Acusticus zu experimentiren ein Ding der Unmöglichkeit ist, braucht wol kaum noch erwähnt zu werden. Es lag also nahe, die Cornealnerven zu wählen.

Diese boten auſſerdem den groſſen Vortheil dar, daſs ſie, in einem durchſichtigen Medium verlaufend, faſt gar keiner Präparation bedurften, um in ihrer ganzen Ausbreitung unterſucht werden zu können. Hierauf aber kam es ganz beſonders an, da an Präparaten, die durch Zerzupfen oder durch Schnitte geliefert werden, man nie ſicher ſein konnte, ob das im Bilde ſich darſtellende Ende der Nervenfaſer als ein durch den phyſiologiſchen Vorgang bedingtes, oder aber als ein durch den präparatoriſchen Eingriff erzeugtes aufzufaſſen wäre. Aus dieſem Grunde muſten auch ſo dicke Hornhäute ausgeſchloſſen werden, daſs deren Nerven nur durch Quer- oder Flächenschnitte der Unterſuchung zugänglich gemacht werden können; es konnten alſo nur ſolche benutzt werden, deren Dicke es erlaubte, alle Schichten des eigentlichen Hornhautgewebes ohne eingreifende Präparation mit einem mitteltarken System (Hrt. 7) zu durchforſchen, oder mindeſtens diejenigen Schichten derſelben, in denen das gröbere Nervengeflecht eingebettet iſt. Von ſämmtlichen Thieren nun, deren Hornhaut dieſen Bedingungen entſpricht, iſt der Froſch nicht nur das zunächſt liegende, ſondern fogar das einzig mögliche, da die kleineren Fiſche und Vögel ſowohl ſehr ſchwer in genügender Menge zu beſchaffen ſind, als auch, was ihre Erhaltung betrifft, Anforderungen ſtellen, denen durch die einem pathologiſchen Inſtitut gewöhnlich zu Gebote ſtehenden Mittel nicht genügt werden kann. Zudem iſt der vorzunehmende Eingriff ein ſo geringfügiger, daſs er als Anlaſs zu einer Ernährungsſtörung kaum in Betracht kommt gegenüber der Entziehung von Freiheit und Nahrung, der die Fröſche notwendiger Weiſe unterworfen werden müſſen.

Um mir das Unterſuchungsmaterial zu verſchaffen, wurden an einem Tage, in derſelben Sitzung, eine gröſſere Menge von Hornhäuten einer und derſelben Behandlung unterworfen, die den Zweck hatte, das normale Verhalten des Nerven zu ſtören. Hauptſächlich bediente ich mich der Aetzung, wie ſie von Boettcher²⁵ angegeben iſt, und die zu modificiren ich keinen Grund hatte. Beſonders betonen will ich das Abtrocknen der Cornea mit Flieſs

papier vor der Aetzung, da, wenn irgend wie zu viel Flüssigkeit sich auf derselben befindet, die Aetzung leicht eine diffuse wird, was man sofort daran erkennt, daß die Iris dort, wohin die mit dem Aetzmittel getränkte Flüssigkeit abgefloßen, ihre schön goldige Färbung verliert und fast schwarz wird.

Als Aetzmittel wurde hauptsächlich eine Lösung von Kali causticum (1 : 2) angewandt, mit welcher ich vollständig genügende Resultate erreichte. Nachdem in einigen Tagen der Aetzbezirk sich aufgeklärt hatte, konnte man am Rande deselben die Nervenfasern wie abgebrochen aufhören sehen. Auch Schwefelsäure leistet gute Dienste, wurde jedoch von mir nur Anfangs angewandt. Vor der Anwendung des, bei den früheren Untersuchungen über die Provenienz der Eiterkörperchen so sehr gerühmten, Chlorzinks für diesen Zweck möchte ich warnen: ich besitze das Präparat einer Hornhaut, die 16 Tage nach der Aetzung zur Beobachtung gelangte, in deren vollständig klarem Aetzbezirk nicht eine einzige Hornhautzelle erhalten war, die Nerven dagegen ein durchaus normales Verhalten zeigten. Die Hornhaut war am 26. März eine ganze Minute lang der Wirkung des Aetzmittels ausgesetzt gewesen.

Als Aetzmittel diente auch mir das 1 Cm. lange mit der Pincette gehaltene, in der Lösung des Aetzmittels getränkte Seidenfädchen. Von Wichtigkeit ist hierbei, daß der Querschnitt, mit welchem die Hornhaut berührt wird, einen Durchmesser von etwa 1 mm. hat. Ein größerer würde durch zu extensive Aetzung die Ernährung der Cornea gefährden, bei einem kleineren aber läuft man Gefahr, nicht etwa einen größeren Nervenstamm nicht in den Aetzbezirk mit hineinzubeziehen (wir sahen ja, daß in der Hornhaut des Frosches die ungefähr 3 μ starken Nerven nie weiter als 0,8 mm. von einander entfernt sind), sondern vielmehr, daß gerade zu der Zeit, wo in den Nervenbahnen des Aetzbezirks sich höchst interessante Vorgänge abspielen, dieser durch massenhaft hineinwachsende Spiefse vollständig eingenommen und so das Untersuchungsfeld der Beobachtung unzugänglich wird. Außerdem

habe ich noch auf das Abtupfen des Seidenfädchens, bevor es auf die Cornea gebracht wird, Gewicht zu legen; eine zu große Menge des Aetzmittels fließt leicht ab, verbreitet sich über die ganze Hornhaut und gefährdet durch Alteration der Iris und des Ciliarkörpers die Ernährung der Cornea. Nach gelungener Aetzung sichtet man auf der Aetzstelle einen, dem Querschnitt des Seidenfädchens an Umfang entsprechenden, weissen, undurchsichtigen, scharf umschriebenen Fleck; die Iris muß dabei ganz unverändert geblieben sein, oder darf höchstens einen Stich ins Graue erhalten haben. Wird sie schwarz, so ist die Hornhaut als verloren zu betrachten, da sie im weiteren Verlauf sich so stark infiltrirt, daß von einer Durchforschung in toto unter dem Mikroskop nicht mehr die Rede sein kann, wenn nicht gar Perforation derselben, oder Atrophie des Bulbus eintritt.

Was nun die Dauer der Aetzung betrifft, so habe ich dieselbe mit 15 Sekunden begonnen und später bis auf 60 Sekunden ausgedehnt. Von Winterfröschen wurde dieser letztgenannte Eingriff recht gut ertragen, bei Frühjahrsfröschen stellte sich in ungefähr der Hälfte der Fälle Perforation der Hornhaut ein, (dieses gilt von der Aetzung mit Kali; die Chlorzinkätzung, 60 Sekunden fortgesetzt, wurde ohne Schaden vertragen). Bei späteren Aetzungen von Frühjahrsfröschen mit Kali beschränkte ich mich auf eine Dauer von 45 Sekunden, wobei die Resultate durchaus zufriedenstellende waren. Eine Aetzungsdauer von 15 Sekunden war unter allen Umständen eine zu kurze. Die Axencylinder zeigten zwar ein abweichendes Verhalten, ich konnte aber nicht die Ueberzeugung gewinnen, daß sie zerstört waren. Ein Versuch, auf derselben Hornhaut zwei Aetzbezirke anzulegen, um das Verhalten zwischen beiden etwa heil gebliebener Nerven zu beobachten, führte zu keinen Resultaten, da entweder die Corneen zu Grunde gingen, oder nur ein großer Aetzbezirk aus der doppelten Aetzung hervorgegangen war.

Noch bevor ich von Tizzonis Arbeit Kenntniß hatte, habe ich die Cornealnerven durch Schnitt getrennt, indem ich an atropinisirten Fröschen mit einem Starmesser die Hornhaut in der Länge von ungefähr $\frac{2}{3}$ eines Cornealdurchmessers durchtrennte. Obwol nun an den durchtrennten Nerven Degeneration und beginnende Regeneration beobachtet werden konnten, gab ich doch diese Methode auf, da am 21. Tage nach der Durchschneidung noch keine Verwachsung der Schnittwände der Cornealsubstanz eingetreten war, sondern nur Verklebung des Schnittes durch Aneinanderlegen des vorderen und hinteren Epithellagers (cfr. 26), nach Entfernung welcher der Schnitt klaffte, mir es aber bei dieser Untersuchung auf die Beobachtung derjenigen Elemente ankam, welche etwa von einem Schnitttrande zum anderen, oder durch die Narbe, hindurchgewachsen wären, ich diese aber jedesmal bei der unumgänglichen Entfernung des, nach Goldfärbung undurchsichtigen, Epithels zerstört hätte. Ich glaube aber doch, daß diese Methode, an Frühjahrsfröschen geübt, für die späteren Stadien zu interessanten Resultaten führen dürfte.

Von einem Abschaben der Cornea, wie es Tizzoni ausgeübt, glaubte ich absehen zu können; ein oberflächliches Abschaben hätte die in den hinteren Schichten der Cornea liegenden Nerven nicht erreicht; um diese zu zerstören, hätte man bis auf die M. Descemeti dringen müssen, damit aber auch die Gefahr einer Perforation nahe gelegt. Ueberdies ist es unverständlich, was durch ein Abschaben bezweckt werden sollte; falls, im besten Falle, die Hornhaut nicht durch Eiterung zu Grunde geht, sondern der Substanzdefect sich zur Heilung anschickt, so kann eine solche nur durch undurchsichtiges Narbengewebe zu Stande kommen, also eine Beobachtung der Nerven nur unmöglich machen. Um übrigens ein endgültiges Urteil über diese Methode abzugeben, wird die von Tizzoni angekündigte Veröffentlichung seiner Untersuchungen über Degeneration blasser Nervenfasern abzuwarten sein, da der betreffende Abschnitt in der Abhandlung im

Archivio per le scienze mediche doch nur als eine vorläufige Mitteilung zu betrachten ist.

Die also vorbereiteten Frösche wurden in einem möglichst geräumigen Glasgefäß aufbewahrt, das in einem der Säle des pathologischen Instituts aufgestellt wurde und so viel Wasser enthielt, daß die Thiere mit Leichtigkeit den Kopf über die Oberfläche desselben erheben konnten. Das Wasser wurde täglich erneuert. Es gelang mir nicht, die Thiere zur Aufnahme von Nahrung zu bringen; Versuche mit Weißbrod, feingehacktem Fleisch lebenden Regenwürmern schlugen fehl, und wurden schliesslich aufgegeben, weil dadurch das Wasser getrübt wurde. Lebende Fliegen wurden allerdings nicht verschmäht, konnten aber nicht in genügender Menge und nur unregelmäßig beschafft werden. Auch muß ich Neumann beistimmen, welcher behauptet, daß Frösche das Hungern sehr gut aushalten. Der Frosch, den ich 92 Tage nach der Aetzung tödtete, zeigte noch gar keine Symptome von Erschöpfung. Allerdings waren während dieses Zeitraumes mehrere Frösche crepirt, doch waren diese nicht immer die in ihrer Ernährung am meisten herabgekommen. Auffallend war unter ihnen die große Zahl auf beiden Augen erblindeter; ich glaube nicht, den an den Augen abgelaufenen Proceß als Todesursache anschuldigen zu dürfen, vielmehr liegt der Gedanke nahe, daß die Erblindung die Thiere verhinderte, etwaige im Wasser befindliche Nahrungsmittel sich anzueignen.

Meine Untersuchungen erstreckten sich auf die Zeit von November bis August; ich hatte also Gelegenheit, die Vorgänge sowohl an Herbst-, als auch an Frühjahrsfröschen zu studiren. Wie vorauszusehen, bot an beiden Gattungen der Proceß keine wesentlichen Verschiedenheiten dar, nur war die Aufeinanderfolge der verschiedenen Stadien bei Frühjahrsfröschen eine raschere.

Um die Hornhäute einer Untersuchung zu unterziehen, tödtete ich die Frösche: In den ersten 24 Stunden nach der Aetzung — erst unmittelbar nach der Aetzung, und dann nach Ablauf je einer

Stunde, während des ersten Monats jeden Tag einen, im 2. Monat jeden 2. Tag, im dritten Monat in Zwischenräumen von 4—5 Tagen. (Auch Hornhäute während dieser Zeit aus irgend welchen Urfachen zu Grunde gegangener Frösche wurden der Untersuchung unterworfen, und lieferten brauchbare Bilder.) Die Hornhaut wurde darauf sofort hart am Scleralrand abgetragen; dieses Verfahren erprobte sich mir als das bei weitem vorzüglichere im Vergleich zu der vorläufigen Enucleation des Bulbus, oder der Abtragung des halben Bulbus durch ein Scherenschlag und nachfolgender Umschneidung der Hornhaut. Man gewinnt erstens an Zeit, dann ist wegen der besseren Handhabe, die man am ganzen Kopfe des Thieres hat, das Verfahren ein technisch viel bequemerer, endlich wird ein Zerren und Quetschen der Cornea vermieden, was, trotzdem daß dadurch die Nerven in ihrer Lage und Gestalt kaum eine Aenderung erfahren dürften, für die Integrität der Hornhaut als ganzes nicht ohne Einfluß sein kann; wenigstens erhielt ich an Präparaten, die nach einer der beiden letztgenannten Methoden hergestellt waren, constant schlechtere Goldfärbung und undeutlichere Bilder, als wenn ich die Hornhaut allein von dem in situ verbliebenen Bulbus entfernte. Zu diesem Zwecke wurde die Sclera an irgend einer vom Cornealrande um 2—3 mm. entfernten Stelle mit einem möglichst scharfen, spitzigen Instrument (Starnadel, Scheren spitze) durchstoßen, und zwar in einer von der Tangente nur wenig nach innen abweichenden Richtung, was besonders bei einer perforirten Hornhaut geboten erscheint, da hier bei radiärem Druck die Linse durch die Perforationsöffnung auszuweichen sucht, und den schon bestehenden Substanzdefect vergrößert. In die Stichstelle wird die eine Branche einer feinen, nach der Fläche gebogenen Schere eingeführt, mit einem Schlage der Scleralrand erreicht, und nun hart an demselben die Hornhaut umschnitten. Ist es gelungen, die Sclera überall am Bulbus zurückzulassen, so wird jetzt mit einer Pincette die Hornhaut leicht entfernt, ohne daß die Iris auch nur aus ihrer Lage verrückt würde. Soll die

Hornhaut frisch untersucht werden, so bringt man sie auf einen Objectträger, auf welchem man schon vorher den humor aqueus desselben Auges aufgefangen hat, macht radiär gerichtete Einschnitte und bedeckt sie mit einem Deckglas. Die anfänglich vollständig homogen erscheinende Hornhaut läßt dann nach 1—2 Stunden sich ganz gut untersuchen. Soll die Cornea gefärbt werden, so kann man entweder sofort zur Färbung schreiten, oder auch die schon im frischen Zustande untersuchte Hornhaut derselben Operation unterwerfen; man erhält auch an diesen noch ganz gute Färbungsergebnisse, falls nach der Ausschneidung nicht mehr als drei Stunden verfloßen sind.

Haben sich vordere Synechien entwickelt, so tut man am besten, falls solche sich nicht bei der Abhebung der Cornea von der Iris lösen, die Cornea mit der anhaftenden Iris oder den Fetzen derselben in ein Uhrglaschen mit destillirtem Wasser zu thun, um dort die Lösung mit Präparirnadel und Pincette vorzunehmen; die im Wasser flottirenden Fetzen lassen sich auf diese Weise am besten erfassen und entfernen, ohne dabei die Cornea zu sehr zu gefährden. Bei Synechien von größerer Ausdehnung bleibt nichts übrig, als die Entfernung nach vorhergegangener Färbung durch Abschaben mit dem Messer vorzunehmen. Dasselbe gilt von Anheftungen der Linse.

Im Anfange meiner Beobachtungen untersuchte ich eine jede Hornhaut, bevor sie gefärbt wurde, im frischen Zustande. Nachdem ich mich überzeugt, daß die Bilder durch die Goldfärbung genau fixirt wurden, habe ich im Verlauf der späteren Untersuchungen nur selten vorläufige Untersuchungen der frischen Cornea vorgenommen; auch bei diesen waren die Bilder mit den erhaltenen Goldbildern identisch.

Als Färbemittel benutzte ich Lösungen von Haematoxylin, Carmin, Ueberosmiumsäure, Palladiumchlorür, Silberfalspeter und Goldchlorid. Da die vier erstgenannten Färbemittel mir keine für meinen Zweck verwendbaren Bilder lieferten, ich mich auch bei

meiner Beschreibung ausschließlich auf Goldbilder stützen werde, so will ich nur auf die Goldfärbung näher eingehen. Ich befolgte die von Boettcher²⁵ geübte Bastian-Pritchardsche Methode.

Die von allen etwa anhängenden Gewebsetszen im Wasser befreite Cornea wird in ein Uhrglas getan, mit der 0,2 % Lösung von Goldchlorid übergossen (2—3 ccm.) und in derselben 10—15 Minuten liegen gelassen. Im Sommer genügten auch 8—12 Min. zu einer vollständigen Durchtränkung des Gewebes mit der Goldlösung. Nach Ablauf dieser Zeit hat die zuvor vollständig durchsichtige Hornhaut eine citronengelbe Färbung angenommen, sie wird wieder in destillirtem Wasser abgespült, in ein kleines Stöpselglas getan und in einer Lösung von Ameisensäure und Amyl-alcohol in Wasser (ana 1 : 100) bis zum nächsten Tage aufbewahrt, also 20—24 Stunden. Im Sommer genügten mir oft 8—10 Stunden, um eine vollständige Reduktion des Goldes, mithin die gewünschte Färbung herbeizuführen. Sobald die Cornea mit dieser Lösung übergossen worden, macht das Citronengelb einer bläulich weissen Färbung Platz. Beim Uebergiessen der Hornhäute mit der Goldlösung geschieht es zuweilen, dass dieselben sich zusammenrollen, was zur Folge hat, dass die vor der Berührung mit der Lösung geschützten Partien ungefärbt bleiben. Um dieses zu verhüten, genügt es, die zusammengerollte Hornhaut mit Hülfe zweier Nadeln auszubreiten; sollte sie trotzdem sich wieder aufrollen, so beseitigen diesen Uebelstand einige radiär angelegte Einschnitte.

Die durch Ameisensäure bedingte Reduktion des Goldchlorids ist, wie bekannt, unabhängig von der Einwirkung des Lichtes; nicht so unabhängig ist sie von der Temperatur. Als in den ersten Tagen des Januar a. c. die Zimmertemperatur im pathologischen Institut sich nicht über $+15^{\circ}$ C. erhob, waren die Tags zuvor nach gewohnter Weise behandelten Cornea genau so bläulich weiss, wie gleich nachdem sie mit der Ameisensäurelösung übergossen worden waren. Nachdem ich das Fläschchen ungefähr

Stunden in der Westentasche getragen hatte, war die Reduktion vollendet.

Um die Hornhaut unter das Mikroskop zu bringen, muß sie ausgebreitet werden, was man durch in den Rand angebrachte radiär gerichtete Einschnitte erreicht. Diese müssen mindestens einen halben Radius tief angelegt werden, da sonst die Cornea unter dem Deckglas sich faltet. Vier einen Viertelkreis zwischen sich lassende Einschnitte genügen meistens. Etwaige Reste der Sclera nebst anhaftender Chorioidea, die intensiv schwarz erscheinen, müssen am besten mit einem scharfen Messer entfernt werden; dieses ist unbedingt erforderlich um ein gleichmäßiges Anliegen des Deckglases zu ermöglichen. Jetzt wird das Epithel der äußeren Oberfläche entfernt; genügt das Abpinseln nicht, so muß man zum Messer greifen, da oft geringe Reste des sich intensiv färbenden Epithels recht störend sein können; mit dem Messer wird sanft und gleichmäßig über die ausgebreitete Cornea hingestrichen, indem die Klinge mit der Hornhautoberfläche einen spitzen, zur Streichrichtung hin offenen Winkel bildet. Ebenso verfährt man mit dem Epithel der Membrana Descemeti, falls solches, was sehr häufig ist, nicht schon vorher abgefallen sein sollte. Hier ist vor der Anwendung des Messers zu warnen, da auch kleine Einrisse in die M. Desc. sehr störend werden können, indem das zu entfernende Epithel sich in dieselben hinein schiebt; solche Präparate sind als verlorene zu betrachten, da es nie gelingt, die Epithelien aus solch einem Spalt zu entfernen. Ueberhaupt muß diese ganze Operation so rasch als möglich ausgeführt werden, um etwaige Verunreinigung durch hinein fallende Staubpartikelchen zu vermeiden, deren Entfernung später unendliche Schwierigkeiten bereitet. Hat man sich unter dem Mikroskop (Hrt. Syst. 7) überzeugt, daß weder Epithelien, noch Schmutzpartikelchen, noch Luftblasen das Bild stören, so wird das Präparat mit der M. Descemeti nach oben entweder in Glycerin (1:10 aq), oder nach vorläufiger Härtung

in Alcohol und Klärung in Nelkenöl in Canadabalsam (Chloroformlösung) eingeschlossen.

Eine gelungene Goldfärbung kennzeichnet sich schon mikroskopisch dadurch, daß die Hornhaut dunkel weinrot, durchscheinend erscheint. Nach Entfernung des Epithels erkennt man, daß diese Färbung durch das intensiv rot gefärbte Epithel bedingt war, die Cornealsubstanz erscheint jetzt rosaviolett, der Aetzbezirk bläulich weiß, so lange in ihm die sich färbenden Elemente fehlen. Im mikroskopischen Bilde erkennt man, daß sich Nerven, Kerne, fixe und Wanderzellen der Hornhaut gefärbt haben, während die Grundsubstanz vollständig durchsichtig, ungefärbt geblieben. Der Grundton der Goldfärbung ist ein Rosaviolett, an recht guten Präparaten sieht man, daß die Nerven von meßbarer Breite einen Stich ins Rote haben, die unmeßbaren, so wie die Primitivfibrillen dunkel, fast schwarz erscheinen, von derselben Farbe wie die Spiefse, während Zellen und Kerne sich mehr dem Blau nähern. An einem Präparat, das gleich nach dem Goldbade in eine Essigsäurelösung gebracht wurde, waren Kerne und Zellen intensiv blau, während die Nerven rosarot erschienen.

Leider liegt es nicht in der Hand des Experimentators, eine solche Färbung zu erzwingen. Auch das peinlichste Befolgen eines Verfahrens, das in der großen Mehrzahl der Fälle zum gewünschten Resultate führte, garantierte nicht unfehlbaren Erfolg. Die Hornhaut erscheint eintönig violettgrau, ein anderes Mal tief dunkelrot, diffus gefärbt, kaum daß Nerven, Zellen und Kerne durch dunklere Schattirung kenntlich sind; bald bleiben einzelne kleinere, zerstreute Partien — nicht, wie oben besprochen, größere zusammenhängende Abschnitte, — ungefärbt; dann wieder ist die Färbung eine bunt scheckige, gelb, orange, rot, violett, in den verschiedensten Abstufungen. Eine Erklärung für diese Erscheinungen weis ich nicht zu geben, so wenig wie Alle, die bisher die Goldfärbung angewandt haben. Gewiß hat Hoyer Recht, wenn er behauptet, die individuellen Verschiedenheiten bei den einzelnen Thieren seien

in dieser Beziehung sehr groß. Auch ich habe beobachtet, daß bei gleichem Verhalten der Hornhäute am lebenden Thiere beide Corneen sich entweder gut oder schlecht färbten — obgleich auch diese Regel nicht ohne Ausnahme ist. So passirte es einmal, daß ich vier vollkommen klare Hornhäute von 2 Fröschen (durch Uebergießen) gleichzeitig in dasselbe Goldbad brachte, gleichzeitig (durch Abgießen der Goldlösung) daraus entfernte, und gleichzeitig mit der Ameisenäurelösung übergoss; eine von ihnen war prächtig gefärbt, die drei übrigen unbrauchbar. Manches läßt sich allerdings erreichen durch peinliche Sauberkeit der zur Verwendung kommenden Gefäße, sowie durch Frische der Lösungen des Goldchlorids und der Ameisenäure, durch möglichst geringes Maltraitiren des frischen Objects, — vollständig vermeiden ließen sich solche Zufälle bis jetzt nie. Fast constant waren schlechte Färbungen bei Schwellungen der Cornea und deren Folgezuständen — Perforationen, Leukomen. Bei diesen erschien die Grundsubstanz fast ausnahmslos dunkel, rot bis violett, tingirt. Oft konnten diese Corneen dennoch ausgenutzt werden, indem ich nach Moscley's²⁸ Vorschlage das vorliegende Präparat in zwei, auch drei Schichten spaltete, von denen die der M. Desc. zunächst liegende alsdann der Untersuchung unterworfen wurde; wenn auch die Grundsubstanz gefärbt blieb, so wurde das Präparat doch durchsichtiger, Zellen und Nerven hoben sich mehr von der Grundsubstanz ab, ja es war nicht mehr schwer, die feinen Nervenfasern von Spießen zu unterscheiden. Bei einiger Uebung gelingt es leicht, mit Hilfe einer geraden und einer gekrümmten Nadel diese Spaltung zu Stande zu bringen. Ebenso verfuhr ich auch bei diffus gefärbten, nicht geschwellten Hornhäuten, und zwar mit zufriedenstellendem Erfolge. Am besten bringt man die Nerven zur Anschauung, wenn man darauf ausgeht, nur die M. Descemiti abzutrennen, mit welcher fast regelmäsig diejenigen Schichten mit abgetrennt werden, in denen die stärkeren Nervengeflechte verlaufen. Doch habe ich dieses Verfahren sehr bald verlassen, da in solchen Prä-

paraten die Reizungszone sich fast nie mit genügender Deutlichkeit abgrenzen liefs.

Will man gespaltene Hornhäute in Canadabalsam aufbewahren, so tut man gut, die Härtung in Alcohol zwischen zwei Deckgläschen vorzunehmen, da sonst leicht starke Schrumpfung eintritt; ebenso, wenn sie in Nelkenöl gebracht werden. Doch lassen sich auf diese Weise unbrauchbar gewordene Präparate immer noch wieder brauchbar machen, indem man den rückgängigen Weg einschlägt, das Nelkenöl durch Alcohol extrahirt, den Alcohol durch destillirtes Wasser, und dann das Präparat im Glycerin aufhebt.

Es könnte der eben dargelegten Untersuchungsmethode der Vorwurf gemacht werden, daß die angewandten Hilfsmittel immer dieselben gewesen, also keinerlei Controle durch andere Reagentien, Färbemittel etc. geübt worden sei. Ich bin mir dessen wohl bewußt, daß histiologische Untersuchungen eines Gewebes, gleichviel ob normal oder pathologisch, erst dadurch eine gewisse Sicherheit erlangen, wenn man auf verschiedenen Wegen, durch Anwendung verschiedener Reagentien etc. zu demselben Resultate gelangt; aber einerseits sind, wie von allen Forschern zugestanden wird, und wovon ich mich selbst überzeugt habe, die Goldbilder so klare und so wenig von denen in der lebenden Hornhaut abweichende, daß man ohne Fehler von jenen auf Vorgänge in der lebenden Cornea schließen kann; und dann ist etwas anderes, ein Gewebe untersuchen, wo ein mißlungenes Präparat sofort durch ein anderes ersetzt werden kann, und wieder etwas anderes, einen Vorgang an einer Reihe von Präparaten zu verfolgen, wo ein mißlungenes Präparat jedesmal eine Lücke bildet; hier gilt es, sich solcher Hilfsmittel zu bedienen, die erfahrungsgemäß am sichersten zum Ziele führen, und dann die ganze Reihe von Präparaten unter möglichst gleichen Bedingungen anzufertigen, also jedenfalls dieselben Färbemittel anzuwenden. Es hätte keinen Sinn gehabt, hätte ich beispielsweise in der ersten Woche meine

Präparate mit Silber tingirt, in der zweiten mit Carmin gefärbt, in der dritten Haemataxylin angewandt, gleichzeitig aber mehrere Serien drei Monate hindurch zu verfolgen, dazu dürfte weder die Zeit noch die Kraft eines Arbeiters ausreichen.

3. Capitel.

Beobachtungen.

Die in der Literatur niedergelegten Referate über Beobachtungen des vorliegenden Processes gewähren keine reiche Ausbeute. Das, was ich darüber gefunden, will ich in Nachfolgendem zusammenstellen.

His, Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der Cornea. Basel 1856. pag. 62.

«Die anatomische Betheiligung der Nerven bei entzündlicher Ergriffenheit des Hornhautgewebes ist sehr unbedeutend, auffallend erscheint ein etwas vermehrter Glanz der einzelnen Fafer.»

Boettcher, Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Eiterkörperchen bei der traumatischen Keratitis. Virchow's Archiv, Bd. 58. 1873. pag. 371.

«Von den feinen Nervenfasern, die in einem Theile der Präparate, aber nicht in allen, erhalten sind, unterscheiden sie» (die geraden goldgefärbten Spalten der Grundsubstanz) «sich durch ihren stets parallelen Verlauf, durch ihre viel unregelmässigere Dicke, und durch ihre Kürze.»

Bogosloffskoy, Experimentelle Studien über die Regeneration des Epithels der Cornea. Virchow's Archiv. Bd. 65. 1875. Er zerstörte die Epithelialnerven durch Abschaben des

Epithels, und constatirte nur das Factum der stattgehabten Regeneration.

Stricker, Weitere Untersuchungen über die Keratitis. Archiv für Augen- und Ohrenheilkunde, Bd. 5. 1876. p. 12.

«Da wo sich durch die geschwellten und getheilten Hornhautkörper Nervenfasern hindurchziehen, erweist sich auch der Inhalt derselben ganz wie die verästigten Zellen in Stücke zertheilt.» Der Nervenfasern ist mächtig geschwellt, die Elemente desselben sind nicht eingewandert; «denn diese Formgebilde lagen im Nerven, und innerhalb jenes Gebietes, wo auch die Zellen zertheilt waren; sobald sich der Nerven in ein Feld erstreckte, wo die Zellen rings um ihn ungetheilt waren, erschien auch er von den bekannten braunen oblongen Linien durchzogen, von welchen normale, in Silber gefärbte Nerven in der Regel durchzogen sind.» — «Entweder ist hier ein Endothel geschwellt und zertheilt worden, oder es haben sich die Axenfasern zertheilt, oder es concurriren beide Zustände mit einander. Ich habe bis jetzt keinen Grund, eines von beiden Momenten auszuschließen.» — «Dass marklose Nervenfasern in Entzündungsherden gleich Zellen anschwellen, habe ich schon früher gesehen.»

Thannhoffer, Ueber Hornhautentzündung, Mittheilungen der ungarischen Academie der Wissenschaften, 8. October 1877. citirt nach dem Centralblatt für praktische Augenheilkunde 1877. pagina 269.

«Während der Entzündung verändern sich auch die Nerven. Diese werden durch in ihren Canälen sich anhäufende Wanderzellen, sowie die Kernwucherung an ihren Scheiden verworren und verschwinden später; mit der Zeit finden sich an ihrer Stelle eigenthümliche langgestreckte Zellen, von denen wahrscheinlich die Regeneration der Nerven ausgeht.»

Senftleben, Beiträge zur Lehre von der Entzündung und den dabei auftretenden corpusculären Elementen. Virchow's Archiv. Bd. 72. 1878. pag. 559. Er constatirte, daß die Einwanderung der Wanderzellen auch auf den Nervenbahnen zu Stande komme.

Tizzoni, Sulla patologia del tessuto nervoso. Archivio per le scienze mediche. Vol. III. Fascio I. 1878. p. 14. Degenerazione e rigenerazione delle fibre pallide.

Er reizte die Nerven der Cornea durch centrale Cauterisation mit lapis infernalis, durch perforirende Schnitte mit dem Rasirmesser, oder durch Abschaben oder Abtragen feiner, oberflächlicher Lamellen. Die Untersuchungen wurden $4\frac{1}{2}$ Monate fortgesetzt. Die Hornhaut wurde untersucht mit der Rückseite nach oben gekehrt, frisch im humor aqueus, die Resultate controllirt nach Färbung in Goldchlorid. Die erstere Art giebt genauere Bilder. Durch körnige Degeneration wird die Fafer geschwellt, zeigt zuweilen Fetttropfen. In ihr traten abgerundete, mit albuminöser Flüssigkeit gefüllte Vacuolen auf. Der degenerirte Nerv endigte nach 4—5 Tagen in einer gewissen Entfernung vom Orte der Verletzung mit einer unregelmäßigen oder einer keulenförmigen Anschwellung, oder mit einer mehr oder weniger unterbrochenen Spirale. Die degenerirte Partie endete an einem Teilungspunkte, dort begann zu gleicher Zeit eine Wucherung der Faferkerne. Bei starken Reizen traten Wanderzellen auf, bald neben dem Axencylinder, bald in den hellen Vacuolen. Bei der Regeneration nahmen die neugebildeten Fasern den Platz der zerstörten ein, zuweilen fand sich eine kleine degenerirte Portion im Verlauf (in continuazione) einer unterbrochenen Linie von Körnern, dem letzten Ueberrest der degenerirten Fafer. Die Regeneration kam außerdem zu Stande durch Verlängerung verschiedener Teile der normalen Fasern,

befonders wuchs der Axencylinder aus dem Stumpfe der Fafer unter der Form eines feinen Fortsatzes, der gewöhnlich in einen glänzenden Punkt auslief.

Beobachtungen, die Degeneration und Regeneration markloser Nerven im Allgemeinen betreffend, finden sich bei folgenden Autoren.

Nach Waller^{1. c.} geht die Regeneration der sympathischen Fasern ebenso von Statten, wie die der anderen. Die neugebildeten Fasern am Vagus der Taube waren nur halb so dick, als die dem gefundenen Seite.

Cossy et Déjeurine, Recherches sur la dégénérescence des nerfs, séparés de leurs centres trophiques. Arch. de Physiol. 1875. sept. année pag. 582.

«Nous n'avons jamais observé aucune lésion bien nette de ces fibres (de Remak); aussi croyons nous avec M. Vulpian, que les lésions, qu'elles présentent, lorsqu'elles sont sectionnées, sont entourés d'une grande obscurité»

Nach Ranvier^{4. c.} (T. II. pag. 14. 15.) find an Warmblütern 4 Tage nach der Durchschneidung die Kerne der Remak'schen Fasern hypertrophirt und besitzen mehrere Kernkörperchen. Ihr Contour zeigt in der Mitte eine leichte Depression, so daß ungefähr die Form eines Zwerchfackes angedeutet wird. Im Innern der Fasern beobachtet man, unregelmäßig verteilt, Vacuolen. Von 5—7 Tage treten Fettkörnchen entweder als Begleiter, oder als Stellvertreter derselben auf. Nie erscheinen innerhalb der Fasern Körnchen mit dem Character des Myelin.

Indem ich zur Darlegung der von mir angestellten Beobachtungen übergehe, muß ich zuvörderst erklären, daß der Proceß der Degeneration und Regeneration sich nicht

durchaus gleichmäfsig bei allen untersuchten Individuen abspielt. Abgesehen von der Jahreszeit, in der die Untersuchung angestellt wurde, dem Ernährungszustande des untersuchten Frosches, die beschleunigend resp. hemmend auf den Verlauf des Processes einwirkten, war von besonderem Einflufs auf denselben der Grad der ursprünglichen Störung, welcher durch den Eingriff erzielt wurde; und zwar stehen hier meine Beobachtungen in Widerspruch zu denen Tizzoni's, der gefunden, dafs die Stärke der Reizung im geraden Verhältnifs stehe zum Verlauf des Processes; nach meinen Beobachtungen findet genau das Gegenteil statt: je stärker die Aetzung war, — d. h. je gröfser der Aetzbezirk geworden, je weiter nach hinten die Hornhautzellen zerstört worden, — um so später traten die einzelnen, noch zu beschreibenden Stadien ein, und um so langsamer verliefen sie. Es kommt jedoch noch ein Moment hinzu: es ist oben schon gesagt worden, dafs ich mir Mühe gab, die Corneen einer jeden Serie stets gleichmäfsig zu ätzen, sowohl was Dauer der Aetzung, als auch Concentration des Aetzmittels und Berührungsfläche des Aetzmittelträgers betraf; wenn ich trotzdem zuweilen im Bereich des Aetzbezirks, unweit der M. Descemeti noch normale fixe Hornhautzellen fand, in andern Fällen derselben Serie Perforation der Cornea, so ist gewifs auch hier eine individuelle Verschiedenheit in der Widerstandsfähigkeit der Versuchsthiere in Anschlag zu bringen.

Zunächst will ich die mikroskopisch sichtbaren Veränderungen besprechen. Unmittelbar nach gelungener Aetzung sieht man an der Aetzstelle eine Trübung auftreten; diese entspricht an Gröfse genau der Berührungsfläche des Aetzmittelträgers, sie verschwindet im Verlauf des ersten, spätestens des zweiten Tages, indem an ihrer Stelle das Epithel abgestofsen wird und ein mehr weniger tiefgehender Substanzdefect entsteht. Die Regeneration des Epithels erfolgt in 2, spätestens in 5 Tagen, doch ist es selten vollkommen durchsichtig, — obwohl auch schon am Ende der ersten Woche vollständig durchsichtige Hornhäute angetroffen

werden, — vielmehr sieht man wieder eine Trübung innerhalb desselben auftreten, die erst viel später vollständig schwindet, jedoch nie bis über die 4—5 Woche hinaus andauert. (Ob eine Trübung dem Epithel angehört oder der Cornealsubstanz, zeigt sich sofort nach Entfernung des Epithels, sei es von der lebenden, sei es von der gefärbten Cornea). Eine in der sechsten Woche und später sichtbare Trübung ist stets die Folge einer zu starken, also misslungenen Aetzung. Unmittelbar nach einer solchen erhält man eine Trübung, die gröfser ist, als die Berührungsfläche des Aetzmittelträgers, oder eine diffuse graublaue Verfärbung der ganzen Hornhaut. In den drauf folgenden Tagen ist letztere nur durch gewaltfames Herabziehen der Nickhaut zur Anschauung zu bringen; sie erscheint trüb, hat einen eitrigen Belag; später, zuweilen schon am dritten Tage ist Perforation eingetreten; oder die Cornea bleibt heil, die Aufhellung erfolgt von der Peripherie her, während die Trübung an Umfang kleiner, an Intensität stärker wird; auch Heilungen gröfserer Perforationen erfolgen auf die bekannte Weise, indem entweder die Iris, oder die Linse den Substanzdefect verlegt. Ich habe jedoch eine grofse Anzahl von Hornhäuten unter den Händen gehabt, die bis auf einen 1,5—2 Mm. breiten Rand reducirt waren, ohne dafs irgend wo eine Adhaesion der Iris stattgefunden hätte. In allen oben angeführten Fällen ist die Cornealsubstanz stark infiltrirt, wird durch Goldchlorid diffus und dunkel gefärbt, und dadurch der Untersuchung sehr schwer zugänglich. Der Regenerationsprocefs an den zerstörten Nerven solcher Hornhäute wird stets auf einer verhältnifsmäfsig sehr niedrigen Stufe angetroffen; dasselbe gilt von Hornhäuten, die prall gespannt, diffus bläulich, aber vollkommen hell durchsichtig erscheinen, — von ihrer Durchsichtigkeit überzeugt man sich leicht beim Einführen der Scherenbranche in die hintere Augenkammer; an Augen mit solchen Hornhäuten findet sich die Iris bis auf einen 0,5 und weniger mm. breiten pigmentlosen Rand reducirt. Auch hier steht die Regeneratiou der Nerven gegen diejenige in gleich

altigen Corneen derselben Serie, an denen jedoch die Aetzung weniger stark ausgefallen, bedeutend zurück. Es besteht also ein gewisser Parallelismus zwischen dem Verhalten der Cornealsubstanz und dem jeweiligen Stadium in dem an den Nerven zu beobachtenden Proceß. Während jedoch sowohl Intensität als Extensität der Affection der Cornealsubstanz von der größten Bedeutung ist, hat selbst eine totale Trübung des Epithels durchaus keinen Einfluß auf den Verlauf des Processes.

Es ist herkömmlicher Brauch, bei der Beschreibung der an gereizten Nerven zur Beobachtung kommenden Erscheinungen erst die der Degeneration darzulegen und dann zu den Regenerationserrscheinungen überzugehen. *Colafranti*³¹ trennt von den Degenerationsercheinungen noch die der traumatischen, primären Veränderung, *Tizzoni*³ scheidet die Regenerationsercheinungen in die der Regeneration und die der Neoformation; letztere läßt er eintreten an Stellen, wo bei Beginn der Beobachtung überhaupt keine Nerven vorhanden waren, so z. B. wo ein Stück aus dem Verlauf des Nerven excidirt worden war. Auch ich werde mich — der Uebersichtlichkeit wegen — an dieses alte Schema halten, obgleich ich, wie sämtliche Autoren, die sich mit vorliegendem Thema beschäftigten, mir sehr wohl dessen bewußt bin, daß die Vorgänge sich zeitlich nicht aus einander halten lassen, daß sie vielmehr in einander greifen, so daß vielfach Regenerationsercheinungen schon an einem Punkte auftreten, bevor die Degenerationsercheinungen an anderen Orten abgelaufen sind.

Ich glaube an diesem Orte noch darauf aufmerksam machen zu müssen, daß diese Arbeit sich wesentlich dadurch von den vorhergehenden unterscheidet, daß in ihr nur Veränderungen des centralen Stumpfes Berücksichtigung finden konnten; von einem peripherischen Nervenstumpfe kann in der Cornea, wegen der im normalen Zustande so vollständig ausgebildeten Anastomosen nicht die Rede sein. Es sind übrigens die Controversen über die Vorgänge im peripherischen Nervenstumpfe, so wie über die *Philippeaux-*

Vulpianische régénération autogénique gegenstandslos geworden, seitdem es Ranvier gelungen, in allen Fällen von Regeneration im peripherischen Stumpfe, selbst da, wo mit bloßem Auge kein verbindendes Mittelstück zu erkennen war, durch die Ueberosmiumsäurereaction beide Stümpfe verbindende, feine Nervenfasern nachzuweisen.

Degeneration.

Ich will es versuchen, die degenerativen und die traumatischen Veränderungen auseinander zu halten. Die letzteren sind bei der Anwendung der Aetzmittel die directe Folge von chemischen Einwirkungen, so z. B. bei der gefättigten Chlorzinklösung die Folge der Wasserentziehung, bei der 33,3 % Lösung des Kali causticum, wie von Rumpf²⁸ u. nachgewiesen, eine Ueberführung des Eiweißkörpers des Axencylinders in einen für die Lymphe löslichen Zustand.

Untersucht man die nach der Decapitation geätzte Hornhaut eines Frosches, so findet man, gleich viel, ob die Aetzung sofort nach der Tödtung, oder $\frac{1}{2}$ —1 Stunde später vorgenommen worden, folgende Veränderungen: Der Aetzbezirk erscheint größer, als die Aetzstelle; ja die Wirkung des Aetzmittels hat oft nur einen geringen Rand der hinteren Hornhautlamellen intact gelassen. Der Aetzbezirk ist von der Randzone scharf abgegrenzt; er erscheint im lebenden Präparat undurchsichtiger, matter, als die intacte Cornea, ebenso im goldgefärbten, wo derselbe außerdem durch ein Grauviolett sich scharf vom Rosaviolett der Randzone unterscheidet. Die fixen Hornhautzellen sind nur durch die Kerncontouren zu erkennen, oft auch nur durch die stärkere Tingirung der den Hornhautzellen zunächst gelegenen, von deren Protoplasma erfüllten Abschnitte der Interlamellar- und Interfascicularlücken; dabei haben die Kerne die Form schmaler Stäbchen angenommen. Die Nerven, die in der intacten Randzone durch die oben besprochene rosarote Färbung sich scharf von der ungefärbten Grundsubstanz abheben, haben im Aetzbezirk genau dieselbe

Färbung, wie dieser; nur bei guter Beleuchtung und oft nur bei starker Vergrößerung (Hrt. Syft. 9.) sind sie von der Grundsubstanz zu unterscheiden. Man sieht dann auch an ihnen die von neben einander gelagerten Nervenfasern herrührende Längstreifung, doch ist diese nicht so deutlich, wie in der Randzone, zugleich werden die einzelnen Fasern schmaler. Die Längstreifung wird, je mehr man sich dem Centrum des Aetzbezirks nähert, um so schwächer und undeutlicher, oft ist schon jetzt hier die Nervenbahn verwischt, und erst nach einer Strecke erkennt man wieder die Fortsetzung desselben Nerven, der zum entgegengesetzten Rande des Aetzbezirks sich begiebt, allmählig wieder deutlicher werdend. In der Mitte des Aetzbezirks scheinen die Nervenbahnen, wo die Contouren erhalten sind, von einer vollständig homogenen Masse erfüllt, an der keine Spur von Streifung mehr sichtbar ist. Ein anderes Mal sieht man die Contouren sich zu einem dicht längsgestreiften Strang aneinander legen, der nach kurzem Verlauf wieder breiter wird, die dichte Längstreifung einbüßt, und wieder zwischen den deutlich gewordenen Contouren die granulirten Linien der von den Nervenfasern herrührenden Längstreifung zeigt. Die Nervenfasern, die in der Randzone, wie in der normalen Cornea, parallel neben einander liegen, erscheinen hier häufig spiralig gewunden. Der Hauptunterschied aber zwischen einem normalen und einem geätzten Cornealnerven ist der, daß die bei ersterem reichlich vorhandenen Kerne bei letzterem verschwunden sind; die Grenze zwischen Randzone und Aetzbezirk ist auch die Grenze zwischen kernführender Nervenfafer und kernloser Längstreifung der im Aetzbezirk verlaufenden Nervenbahn. Nur äußerst selten sieht man in der Nähe des Aetzbezirks in der Nervenbahn Contouren, die an Größe und Form einem Kerncontour entsprechen, aber nur eine mit der Umgebung gleiche Färbung zeigende, äußerst fein granulirte Masse umschließen. Fig. II. und IV.

Genau dasselbe Bild erhält man an Hornhäuten, die unmittelbar nach der Aetzung getödteten Fröschen entnommen waren;

nur sind hier die Grenzen des Aetzbezirks nicht so weit zur Peripherie hin ausgedehnt, wie oben, wenn gleich noch immer weiter, als die Grenzen der Aetzstelle.

Constant ist der eigentümliche matte Farbenton des Aetzbezirks, der dunkler ist, als die Färbung in der Grundsubstanz der Randzone. Setzt man die Beobachtung fort, indem man Stunde um Stunde neue aus der Zahl der gleichzeitig geätzten Frösche tödtet, so sieht man nicht früher, als vier Stunden nach der Aetzung die dunkle Färbung des Aetzbezirks heller werden, indem zuerst an der Grenze zwischen Aetzbezirk und normaler Hornhaut sich die Färbung aufhellt, und zwar gleichzeitig rund herum, oder auch nur von einer Seite beginnend. 7—8 Stunden nach der Aetzung ist meist der Aetzbezirk schon aufgehellt. Das Bild, welches die Nerven jetzt darbieten, ist nicht wesentlich verschieden, von dem oben beschriebenen, es ist höchstens deutlicher geworden: die einzelnen Nervenfasern der Stämmchen der Randzone lassen sich in den Aetzbezirk hinein verfolgen, sie sind hier stets von der Farbe der Grundsubstanz, stets fehlen die in der Randzone so reichlich vorhandenen Kerne; während am Rande des Aetzbezirks die Längsstreifung die Nerven sich noch deutlich in die Nervenbahn des Aetzbezirks verfolgen läßt, wird sie, je näher dem Centrum, um so undeutlicher. Die Granulirung überwiegt die Streifenzeichnung, man sieht schliesslich nur eine verworrene granulirte Masse, bis auch diese schwindet, und man nur eine fein granulirte, fast homogene Masse zwischen den Contouren sieht (letzteres allerdings recht selten). 24 Stunden nach der Aetzung hat man noch immer dasselbe Bild, je nachdem die Färbung gelungen ist, mehr weniger deutlich. Zuweilen sieht man in der Randzone, mehr als normal, Wanderzellen auftreten, früher als 14 Stunden nach der Aetzung habe ich sie nicht in derselben beobachtet. Nach einer zu energischen Aetzung, die sich durch sofort nach der Ausschneidung wahrnehmbare stärkere Schwellung der Hornhaut auszeichnet, erscheinen sie in gröfserer Menge. Sie sind jedoch hier noch

eben so oft in der Grundsubstanz, wie in den Nervenbahnen zu beobachten.

Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die eben beschriebenen Erscheinungen an den Nerven als traumatische Veränderungen, als Folgeerscheinungen des Eingriffs aufzufassen sind. Bei den nun zu beschreibenden dürften auch schon degenerative Vorgänge mitspielen.

2—3 Tage nach der Aetzung sieht man die Nervenstämmchen der Randzone in vollständig normalem Zustande, entweder bis hart an den Aetzbezirk verlaufen, oder ganz kurz vor demselben, noch innerhalb der sich ausbildenden Reizungszone in den gleich zu beschreibenden Zustand übergehen: die im normalen Nerven dicht aneinander gelagerten Fasern werden schmaler, scheinen aus einander zu weichen und zeigen, bald nachdem das normale Verhalten aufgehört hat, Querspalten, welche, immer rascher aufeinander folgend, immer kleinere, dunkel, fast schwarz gefärbte Stücke von einander trennen, bis in der Mitte des Aetzbezirks die Nervenbahn durch feine in Längsreihen geordnete Körnchen angefüllt erscheint. Schließlich verwirren sich diese Längsreihen, und man sieht nur eine stark granulirte Masse vor sich.

Nach zu starken, besonders Kaliätzungen sieht man um dieselbe Zeit im Centrum des Aetzbezirks feine, blasse Linien, die bald dicht neben einander liegen, bald sich von einander entfernen, dann wieder in Spiralen sich um einander windend verlaufen; die fast parallelen Contouren des Nervenkanals sind auch durch feine blasse Linien angedeutet. Von Zeit zu Zeit sieht man in ihnen Wanderzellen, bald einzeln, bald in Gruppen von 3 bis 5 dicht nebeneinander liegend; verfolgt man die Nervenkanäle zur Hornhautperipherie hin, so sieht man dieselben vollgestopft von Wanderzellen, so daß die Canäle wie Pfröpfe in den Aetzbezirk hincintragen, ebenso sind die Nervenkanäle in der Randzone von denselben Gebilden erfüllt, so daß zwischen und neben ihnen keine Spur von Nervenfasern zu entdecken ist. Zu gleicher Zeit sieht man auch

in der Cornealsubstanz der Randzone reichliche Wanderzellen, die jedoch die sonstige Structur des Cornealgewebes nicht verdecken; in der Reizungszone finden sich gar keine, oder, nur vereinzelt, spärliche Wanderzellen, während im Centrum oft schon ein Entzündungsherd in der Bildung begriffen ist. Nicht alle Nerven eines Präparats zeigen das oben beschriebene Bild; an einigen sieht man in der Randzone normale Nervenfasern zwischen denen nur vereinzelt Wanderzellen sichtbar sind. Die Faserung erstreckt sich wie auch sonst bis hart an den Aetzbezirk. (Fig. III.)

Die Deutung obiger Vorgänge dürfte folgende sein: Der Effect einer Aetzung beschränkt sich bekanntlich nicht auf die Applicationsstelle, sondern erstreckt sich auf so viel vom umliegenden Gewebe, als die Menge des angewandten, durch Diffusion sich ausbreitenden, Aetzmittels ausreicht, um mit dem zu ätzenden Gewebe die betreffende chemische Verbindung zu bilden. Ferner ist es klar, daß nur an der Berührungsstelle das Aetzmittel mit seiner vollen zerstörenden Kraft einwirken kann, während weiter von ihr schon die verdunnende, bindende oder neutralisirende Einwirkung des Gewebes und Gewebsflüsses in Betracht kommt; es wird also bei jeder Aetzung Abstufungen geben, von der vollständigen Zerstörung an, bis zur einfachen Reizung. Demgemäß findet sich auch im vorliegenden Falle — wenn man die Kalilauge ins Auge faßt, deren Resultate hauptsächlich diesen Untersuchungen zu Grunde gelegt sind — eine Zerstörung des Cornealepithels, bei zu energischer Application selbst eine Zerstörung der vorderen Lamellen der Cornealsubstanz mit Eröffnung des Saftluckensystems, während weiter in der Umgebung der Effect der Aetzung immer schwächer wird, bis in der normalen Cornealsubstanz derselbe sich nur als Reizung — durch die Einziehung der Fortsätze der Hornhautzellen u. s. w. kundgibt. Auch an den Nervenstämmen sehen wir, in der Applicationsstelle zunächst, wenn auch noch durch die mächtige Epithelschicht und den größten Theil der Corneallamellen getrennt liegenden Abschnitten, einer

sofortigen Schwund der längsfasrigen Structur, was ich durch Bildung eines homogenen Kalialbuminats mir erkläre.

Dafs aber auch die übrigen nicht verflüssigten Nervenfasern eine molekuläre Veränderung eingegangen sind, beweist die constante Abweichung in der Goldfärbung derselben von der den Nerven im normalen Cornealgewebe eigenthümlichen, ebenso der Schwund der Kerne, die mithin eine noch hinfalligere Eiweifs-Verbindung sind, als die Axencylinder, endlich auch noch die veränderte Structur der Nervenfafer, die im Aetzbezirk viel gröber granulirt erscheint.

Wie weit sich nun hier die chemische Wirkung erstreckt und wo der Reizungszustand beginnt, wage ich nicht zu entscheiden; jedenfalls scheint die so oder so veränderte Nervenfafer nach einiger Zeit (1—2 Tagen) sich so weit zu restauriren, dafs sie wieder die Goldfärbung annimmt, um dann dem oben beschriebenen körnigen Zerfall zu unterliegen; dieser Zerfall nun wird, wie die Untersuchungen R u m p f's ²⁸ zeigen, durch die die Nerven umspülende Lymphe hervorgebracht, und zwar wird der Zerfall dort ein rascherer sein, wo die Widerstandsfähigkeit des Gewebes am meisten gebrochen ist, also dort, wo das Gewebe als solches schon vollständig geschmolzen, dann wo die Einwirkung des Aetzmittels eine stärkere war, endlich an den Theilen, die am meisten vom trophischen Centrum entfernt sind, also zunächst der Mitte des Aetzbezirks liegen, welche letzte beide Bedingungen im vorliegenden Falle zusammenfallen. An einigen Präparaten sah ich statt des körnigen Zerfalls eine unregelmässige Querstreifung der Nervenfasern, Bilder, die sehr an die von B o l l ²⁹ beschriebene auch von R u m p f gesehene federfelenartige Zeichnung erinnerten. Auch das weitere Schicksal des Axencylinders ist schon aus den oben beschriebenen Bildern ersichtlich: zwischen den von verschiedenen Seiten in den Aetzbezirk eintretenden Nerven sehen wir als Verbindungsglied oft einen schmalen, aus blassen, feinen, parallel oder spiralig verlaufenden Linien zusammengesetzten Strang — es

sind das die Nervenscheiden, die nach Entleerung ihres Inhalts collabirt sind; der zerfallene gelöste Inhalt der Scheiden diffundirt also durch dieselben, um dann durch die circulirende Lymphe fortgeschwemmt zu werden. Von einer Beteiligung der Wanderzellen bei diesem Vorgange, wie ihn Tizzoni beschreibt, habe ich nie etwas wahrnehmen können; nach ihm soll der Axencylinder sowol durch Pression der Wanderzellen zerstückelt, als auch durch Appropriation zerstört werden, indem die mit ihrer Beute beladenen Zellen die Scheide verlassen, um im umgebenden Bindegewebe und den Lymphräumen aufzutreten (pag. 34.)

In den Präparaten, die der Beschreibung des von mir geschilderten Vorganges zu Grunde liegen, habe ich nie eine Wanderzelle, weder in den Nervenbahnen, noch in deren Umgebung gefunden. Allerdings treten solche auf, und zwar nach zu intensiver Aetzung, durch welche das Saftcanalsystem der Cornea eröffnet worden. Durch dieses scheint das nach Maßgabe des Eindringens sich verdünnende Aetzmittel sich zu verbreiten, was ich daraus schliesse, daß gegen das Ende einer zu starken oder zu langdauernden Aetzung die Goldfarbe der Iris einem tiefen Schwarz Platz macht, das Kali mithin in die vordere Kammer gedrungen sein muß. (Berührungen der bloß gelegten Iris mit der Aetzkalilösung hatten genau denselben Effect). Ist nun das Aetzmittel in mehr weniger concentrirter Form bereits in die vordere Kammer gedrungen, so muß es seine Einwirkung beim Passiren der Saftcanälchen auch auf die in denselben enthaltenen Gebilde ausgeübt haben, also auch auf die Nerven, deren Canäle mit denen des Saftcanalsystems offen communiciren. Dadurch sind die Nerven, wie schon dargelegt, in einen Zustand leichter Resorptionsfähigkeit übergeführt, und in der That sieht man in solchen Hornhäuten keine Spur von Nervenfasern in den Canälen, an ihrer Stelle aber dicht gedrängt, Wanderzellen. Daß diese von der Peripherie herkommen, wird dadurch bewiesen, daß der Nervencanal von der Peripherie bis ziemlich weit in den Aetzbezirk hinein diese

starke Anfüllung zeigt, während in der Mitte des Aetzbezirks nur hie und da eine oder mehrere (3—5) Wanderzellen in den Nervenkanälen sich finden. Auch hier kann von einer destruktiven Arbeit der Wanderzellen nicht die Rede sein; die wenigen im Aetzbezirk befindlichen Zellen können unmöglich die gänzliche Zerstörung der Nervenfasern zu Wege gebracht haben, zur Annahme aber, daß sie nach vollbrachter Arbeit so schnell sich fortgemacht hätten, daß auch keine Spur mehr von ihnen in der Nähe der Nervenfasern übrig geblieben wäre, fehlen sämtliche Anhaltspunkte. Viel ungezwungener erklärt sich die Anwesenheit der Wanderzellen so, daß, nachdem auf den Aetzungsreiz hin die Einwanderung begonnen, die Wanderzellen den bequemsten Weg gewählt hatten, indem sie in die ihres Inhalts zum großen Teil schon beraubten Nervenkanäle aus den anastomosierenden Saftkanälen und Saftlücken sich hinein begaben oder durch den Saftstrom hinein gerissen wurden, und dort schließlich so dicht neben einander zu liegen kamen, daß eine Weiterbewegung nicht mehr möglich war und nur die am freien Ende der Säule befindlichen Zellen sich frei machen und ihren Weg fortsetzen konnten. (Fig. III).

Im weiteren Verlauf der Beobachtung sieht man nun die Querspaltung der Axencylinder sich fortsetzen, bis schließlich in den Nervenkanälen ein feinkörniger, in Goldchlorid sich tief dunkel färbender Detritus übrig bleibt, der entweder gleichmäßig in denselben verteilt ist, oder zu Haufen zusammen geballt erscheint; im letzteren Falle ist zwischen diesen Haufen der Nervenkanal ganz hell, heller als die Grundsubstanz, nicht ler, wie schon Ranvier constatirte. Oft sieht man um diese Körnchen herum, so wie im Verlaufe des ganzen sichtbaren Nervenkanals, die schon beschriebenen feinen blaffen Linien, bald dichter aneinander liegend, bald mehr auseinander weichend. In einzelnen seltenen Fällen beobachtet man gegen Ende der ersten oder Anfang der zweiten Woche an den gereizten Fasern äußerst feine Fetttröpfchen, die dem Verlauf der Fasern nach in Längsreihen zu 4—8 in der

Reihe angeordnet find; besonders häufig sieht man sie innerhalb der geätzten Kerncontouren, in denen 3—4 neben einander stehen. Vor Verwechslung derselben mit Kugelbakterien, denen sie an Gröfse sehr ähnlich sehen, schützt der Gebrauch der Stellschraube, da Bakterien von mir nur an den Oberflächen der Hornhaut beobachtet wurden. Sowohl Kugel- als auch Stäbchenbakterien sind ein recht häufiger Befund bei der Untersuchung der lebenden Cornea; bei der Abstreifung des Epithels nach der Färbung werden auch sie gewöhnlich entfernt, bleiben jedoch noch oft genug auf der Cornea zurück.

Wann die Degenerationsproceffe an den Nervenfasern ihr Ende erreichen, ist schwer zu entscheiden; an einigen besonders an Sommerfröschen, findet man schon am 12—15 Tage keine Spur des körnigen Detritus mehr, an anderen, vorzüglich an Winterfröschen, sind noch bedeutende Haufen von Detritus am 24. Tage nach der Aetzung zu sehn.

Während die oben beschriebenen Proceffe an den Nervenfasern des Aetzbezirks sich abspielen, vollzieht sich ein ähnlicher Vorgang an den innerhalb der Randzone in der Nähe des Aetzbezirks verlaufenden Nerven, und zwar nicht nur an den in radiärer Richtung zum Centrum des Aetzbezirks hinziehenden, sondern auch an denen, die tangential am Rande des Aetzbezirks verlaufen. Schon 24 Stunden nach der Aetzung sieht man an einigen Stümpfen, die bis hart an den Aetzbezirk heranreichen, die noch dunkel gefärbten Enden der Fasern wie abgebröckelt durch eine durchsichtige Linie vom Nervenstamm getrennt. Diese Zerbröckelung schreitet fort, ist noch recht deutlich am 3—5 Tage, von da an ist sie nur bei starker Vergrößerung und sehr guter Beleuchtung erkennbar, da die Vorgänge verdunkelt werden, erstens durch die zu derselben Zeit auftretende Spiessbildung, dann auch noch durch die gleich zu besprechende Kernwucherung. Noch ein Grund, weswegen es in der ersten Zeit schwer fällt, genauere Einsicht in die Vorgänge an den Nervenstümpfen zu

erlangen, ist die Zusammenballung der Fasertrümmer zu einem dunkeln undurchsichtigen Haufen, der oft bis in die 3.—4. Woche liegen bleibt, ohne eine Umbildung oder Resorption zu erfahren. Erst in späterer Zeit, wenn die Spiegsbildung nicht mehr so lebhaft ist, gelingt es, sich davon zu überzeugen, daß zwischen den im Lumen des Nervencanals befindlichen Regenerationskernen sich entweder gar keine Faserung, oder doch nur einzelne, an Gesamtmasse der Weite des Nervencanals bei weitem nicht entsprechende Fasern zeigen.

Wenn auch nicht grade häufig, so kommt es doch vor, daß ein stärkerer, tangential verlaufender Stamm nur mit einem Teil seiner Fasern in das Bereich der Aetzung fällt; an solchen hat man das interessante Bild, daß die in den Aetzbezirk fallenden Fasern degeneriren, während die in der Randzone verlaufenden intact bleiben, wenn auch zwischen ihnen Regenerationskerne sichtbar werden. Es setzt sich also eine eingeleitete Degeneration nicht in transversaler Richtung fort.

Sowol an den zum Aetzbezirk ziehenden Stümpfen, als auch an den zum Teil innerhalb desselben verlaufenden Stämmen läßt sich constatiren, daß der Faserzerfall nur bis zum nächsten Knotenpunkte reicht; wird jedoch, was sehr selten ist, dieser überschritten, so hört der Zerfall jedenfalls beim darauffolgenden Knotenpunkt auf. Centralwärts von diesem hat der Nerv normale Nervenfasern, wenn sie auch oft ein wenig verworren erscheinen. Dieses ist schon von Tizzoni constatirt worden. — Auch die Kerne an ihnen behalten ihre Form, Größe und die grobe Granulirung bei, erleiden aber in so fern eine molekuläre Veränderung, als sie um das Ende der ersten, und in der zweiten Woche nur sehr schwach, blaßroth gefärbt werden. Wie sich die in den betroffenen Abschnitten befindlichen Kerne verhalten, ob sie — gleichzeitig, vor oder nach den Zerfall der Fasern — auch einem körnigen Zerfall unterworfen werden, oder aber ob sie persistirend, bei der Kernwucherung concurriren, ist mir nicht

möglich gewesen zu beobachten. Nur ein mal am 5. Tage sah ich im Stumpfe eines sich noch normal verhaltenden Nerven die dem Rande des Aetzbezirks zunächst gelegenen Kerne durch helle Linien der Quere nach in 3—4 Abschnitte getrennt, die wenn man sie zusammen gefügt hätte, genau die Gröfse und Gestalt eines normalen Kernes ergeben hätten. — Tizzoni erwähnt im Abschnitte: «Kernwucherung und Hypertrophie des Protoplasma» einer noch nicht vor ihm beschriebenen Art von Kernwucherung, bei der der Kern sich verlängert, dann durch eine oder mehrere helle Linien, die quer durch ihn hindurchziehen, gespalten erscheint, so dafs er sich in 2, 3 oder 4 Teile teilt, welche sich von einander entfernen und ebenso viele Kerne bilden. — Diesen Vorgang will er in vorgeschrittenen Stadien beobachtet haben. So ähnlich auch der von Tizzoni beschriebene Vorgang in seinem Beginne dem von mir beobachteten ist, so mufs ich doch bezweifeln, dafs in dem von mir beobachteten Falle die Teilung der Beginn einer Kernwucherung war, da sonst auch schon an andern Teilen des Nerven die Regenerationskerne aufgetreten wären; vielmehr möchte ich die von mir beobachtete Teilung als beginnenden Zerfall deuten. Es wäre ja immerhin möglich, dafs in vorgeschrittenen Stadien die Teilung des Kernes durch helle Linien die Einleitung zu einer Kernwucherung wäre.

Ueber das Schickfal, das die feinen Nerven der Cornea bei der Degeneration erfahren, ist zu bemerken, dafs sie schon 24 Stunden nach der Aetzung vollständig verschwunden sind, ohne dafs es möglich gewesen wäre, structurelle Veränderungen an ihnen zu constatiren. Zwei mal sah ich drei Tage nach offenbar zu leichter Aetzung den ganzen Stromaplexus (Waldeyer⁶) vollständig erhalten, selbst die varikösen Fasern waren intact; in späteren Stadien habe ich selbst nach leichten Aetzungen nie mehr diesen Plexus beobachtet, bevor nicht die stärkeren Nervenstämmen, von denen derselbe entspringt, vollständig regeneriert waren.

Was nun endlich die präsumirte Nervenscheide betrifft, so bin ich gerade durch die Beobachtung des Degenerationsprozesses zu der Ueberzeugung von ihrer Existenz gedrängt worden. Als was anderes könnten denn die beschriebenen, feinen, blaffen, bald parallelen, bald spiralig verlaufenden Linien gedeutet werden? Nachdem die Axencylinder aus der Scheide auf die eine oder die andere Weise verschwunden waren, mußte die Scheide unter dem Drucke der sie umspülenden Lymphe collabiren, sich falten, und so, sonst wegen ihrer Zartheit, und des mit der Umgebung gleichen Lichtbrechungsvermögens unsichtbar, zur Anschauung kommen. Degenerative Vorgänge an ihr habe ich nicht beobachten können, wohl aber Zerstörung, bedingt durch die chemische Einwirkung des Aetzmittels. In solchen Fällen war trotz der besten Färbung, bei vollständiger Klarheit des Aetzbezirks, die Scheide nur eine gewisse, gröfsere oder kleinere, Strecke weit in den Aetzbezirk zu verfolgen; dann war, auch mit starken Vergröfserungen, keine Spur von ihr zu entdecken. Die feinen Linien endigten entweder alle auf einmal, oder eine nach der andern, ohne dafs eine Fortsetzung aufzufinden gewesen wäre. In der Mehrzahl der Fälle jedoch liefsen sich diese Linien von der einen Seite des Aetzbezirkes bis zur entgegengesetzten verfolgen, wo sie wieder mit einem Nervenstumpf in Verbindung traten. Auch solche Fälle kamen zur Beobachtung, wo einige durch den Aetzbezirk getrennte Nervenstämmchen durch einen solchen Strang verbunden waren, während an demselben Auge die durch die blaffen feinen Linien gebildete Fortsetzung eines anderen Nerven nach kürzerem oder längerem Verlauf im Aetzbezirke aufhörte. Hier hatte offenbar das Aetzmittel an verschiedenen Stellen verschiedene Wirkung ausgeübt, die eine Nervenbahn war zerstört, die andere nur mehr weniger stark gereizt worden. Auffallend ist, dafs zugleich mit der Zerstörung der Scheide auch der Nervencanal zu veröden scheint, wodurch bei der nun zu besprechenden Regeneration sehr verschiedene Bilder entstehn.

Regeneration.

Bevor ich die Darstellung der regenerativen Vorgänge beginne, muß ich noch das Phänomen der **Kernwucherung** besprechen, das von den meisten Autoren zusammen mit den degenerativen Vorgängen behandelt wird. Der Anlaß dazu mag wol gewesen sein, daß die Kernwucherung fast gleichzeitig mit der Degeneration verläuft, und mit dem Ende derselben ihren Höhepunkt erreicht, auch wohl der, daß einige Autoren den Kernen einen activen Antheil an der Degeneration, zumal des Axencylinders zuschreiben. Da es mir nicht möglich gewesen ist, die Beteiligung der Kerne in irgend einem Stadium der Degeneration nachzuweisen, so bespreche ich die Kernwucherung an diesem Ort, zumal da es mir gelungen ist, die Beteiligung der Regenerationskerne an der Regeneration der normalen Nervenkerne zu beobachten.

Bei Frühlingsfröschen ungefähr 5 Tage nach der Aetzung, bei Winterfröschen nicht vor dem 7ten Tage sieht man in den Bahnen der normalen Cornealnerven in der Nähe des Aetzbezirks und zwar an den diesem zunächst gelegenen Knotenpunkten, oder zwischen diesen und der Grenze des Aetzbezirks Gebilde auftreten, die den Charakter von Kernen an sich tragen; sie sind scharf contourirt, haben einen fein granulirten Inhalt und zeigen ein central oder excentrisch gelegenes deutliches Kernkörperchen, zuweilen auch zwei oder drei. Die normaler Weise in den Knotenpunkten befindlichen, dreieckig oder unregelmäßig geformten Kerne sind verschwunden, an ihre Stelle sind runde Kerne getreten, die einen Durchmesser von $5,6-8,2 \mu$ haben; ihre Zahl ist je nach dem Umfang des Knotenpunktes verschieden, 3-6 und mehr. Neben diesen runden sieht man wohl auch schon ovale; diese Form findet man ausschließlich vertreten in den von den Knotenpunkten sich entfernenden Nervenbahnen und zwar zuerst in den dem Centrum des Aetzbezirks zustrebenden, dann aber auch in den seitlich vom Knotenpunkt abgehenden, den Aetzbezirk flankirenden, endlich in den von der Peripherie her zum

Knotenpunkt hinziehenden Nervencanälen. Die Reihenfolge im Reichtum der verschiedenen Fundorte an solchen Kernen ist die von mir bei der Herzzählung derselben eingehaltene. In der Mitte der zweiten Woche ist es schwer, einen runden Kern irgendwo aufzufinden, man sieht jetzt nur noch ovale; ihre Gröfse ist nicht unbeträchtlichen Schwankungen unterworfen, ihr Längsdurchmesser schwankt zwischen $11-20 \mu$, ihr Querdurchmesser zwischen $5,6-10 \mu$, die Durchschnittsmasse sind ungefähr $12,5 \mu$ resp. $6,8 \mu$, constant bei ihnen ist nur das Verhältnifs zwischen Quer- und Längsdurchmesser, das gewöhnlich $1:2$ beträgt, jedoch nie kleiner als $1:2,5$ wird.

Wären diese Regenerationskerne, wie ich sie der Kürze wegen nennen will, nicht schon durch dieses Mafsverhältnifs hinreichend von den normalen Nervenkerneln unterschieden, so dürften die feinere Granulirung, die deutlichen Kernkörperchen, und, bei gelungener Goldfärbung, das blasse Hellrosa derselben, sie vor einer Verwechslung mit den normalen Nervenkerneln schützen, bei denen wie schon früher gesagt, das Verhältnifs von Querdurchmesser zu Längsdurchmesser $1:5$ und mehr betrug, die Granulirung eine gröbere, das Kernkörperchen deswegen kaum sichtbar war, und die Goldfärbung ein gefättigt dunkles Rosarot ergab. Eine Verwechslung derselben mit Wanderzellen dürfte wohl unmöglich sein. Wohl aber mufs ich die runden in den Knotenpunkten beschriebenen Zellen vor einer solchen Verwechslung sicher stellen. Nach vielfachen, möglichst genauen Messungen bestimmte ich den Durchmesser, der in der Cornea gefundenen Wanderzellen $= 2,5-4,2 \mu$; (letzteren Durchmesser an einer Zelle in einem des Nerven beraubten Nervenkanal); der Inhalt derselben ist stets sehr stark und grob granulirt, die Färbung derselben fällt genau so wie die der normalen Nervenkerne aus. Es dürfte also von sämtlichen Eigenschaften der Wanderzelle nur die runde Form auch auf die runden Kerne passen. Sollte hingegen behauptet werden, dafs Wanderzellen ja durch Aufnahme verschiedener Stoffe leicht an Gröfse

zunehmen und damit auch einen anderen Inhalt zeigen können, so muß ich einwenden, daß selbst die Vergrößerung des Durchmesser um das Doppelte zugegeben, bei der Art vergrößerten Wanderzellen auch die Ursache der Vergrößerung, ich meine die aufgenommenen Stoffe, sichtbar fein müssen; dieses aber ist keineswegs der Fall; die feine Granulirung, und die blasse Färbung der runden Kerne ist eine durchaus gleichmäßige und wird durch Nichts unterbrochen, was irgend wie einem aufgenommenen fremden Bestandteil ähnlich sehen könnte. Daß sie so rasch die aufgenommenen Stoffe assimiliert hätten, dürfte wol kaum behauptet werden. Entscheidend aber ist das Moment, daß in der Nähe der runden Kerne niemals Wanderzellen angetroffen werden; es wäre unverständlich, warum grade drei, oder fünf oder acht Wanderzellen sich zusammen aufgemacht haben, genau bis zum Knotenpunkt gelangt sein sollten, um dort, nachdem sie die behauptete Veränderung durchgemacht, stehen zu bleiben; vielmehr sieht man überall, wo den Wanderzellen eine irgend wie erhebliche Tätigkeit zugeschrieben werden muß, diese in überwältigenden Mengen auftreten. Wenn nun hier die Zahl der runden Kerne stets eine beschränkte ist, und diese nur an ganz bestimmten Orten auftreten — nur ein mal ist es mir gelungen, einen runden Kern in geringer Entfernung vom Knotenpunkt, zwischen diesem und dem Aetzbezirk anzutreffen, — so wird man sich nach einer localen Ursache für ihre Provenienz umsehen müssen. Als eine solche bietet sich nun die stets beschränkte Anzahl der unregelmäßig geformten Kerne an den Knotenpunkten dar; zudem sind diese zugleich mit dem Auftreten der runden Kerne verschwunden. Es liegt also sehr nahe, daß die Kerne des Knotenpunktes unter dem Einfluß der entzündlichen Reizung geschwellt, die runde Form angenommen haben, unter welcher sie sich, an ihrem alten Standorte, dem Beobachter präsentiren. Erwägt man ferner, daß die runden Kerne, abgesehen von Größe und Gestalt, die größte Uebereinstimmung mit den ovalen Kernen zeigen, daß sie gleich-

sam den Mittelpunkt bilden, um die sich die ovalen Kerne gruppieren, daß sie nach kurzem Bestehen verschwinden, um Kernen ausschließlich ovaler Form Platz zu machen, so wird der Schluss nicht zu gewagt erscheinen, daß die ovalen Kerne Abkömmlinge der runden sind, mithin von den Scheidenkernen der Knotenpunkte abstammen. — Die Umwandlung der Scheidenkerne in runde habe ich nicht beobachten können, ebenso ist es mir nur ein mal gelungen, zwei mit stark abgeplatteten Seiten aneinanderliegende runde Kerne zu sehn, was auf vorhergegangene Teilung schließen ließe; dagegen habe ich an den ovalen sehr häufig Bilder gesehen, welche die Anbahnung eines Teilungsprocesses darstellten, sie erscheinen nierenförmig, bisquitförmig, mit einem Einschnitt auf der Längsseite, der nahe an den andern Randcontour hinan reichte. Ob Bilder, die ein Zusammenklappen in der Längsaxe zeigten, auch hieher zu rechnen sind, lasse ich dahin gestellt. Solche Bilder konnten überall, wo nur Regenerationskerne sich fanden, beobachtet werden. In solchen zeigten sich regelmäßig zwei Kernkörperchen, noch häufiger jedoch wurden Kerne gesehen mit zwei, auch drei Kernkörperchen, die keine Spur von Teilung an sich trugen.

Wie schon gesagt, können sich die Regenerationskerne nach allen Seiten längs der Nervencanäle verbreiten, doch tun sie es nur dann, wenn ihre Bildung im Knotenpunkte eine gar zu stürmische ist. Gewöhnlich sieht man sie nur in den, der Mitte des Aetzbezirks zustrebenden, also des Nerveninhalts mehr weniger beraubten Canälen, und nur wenn diese schon überfüllt sind, findet man sie erst in den zur Seite sich abzweigenden, und dann in dem von der Peripherie zum Knotenpunkte verlaufenden Nervencanälen; dasselbe findet statt, sobald die Kerne in den Canälen auf ein Hinderniß stoßen. Was die Art ihrer Fortbewegung betrifft, so schliesse ich mich der Anschauung Ranvier's an, der sie durch das um sie her gebildete Protoplasma weiter geschoben werden läßt. Dieses Protoplasma kommt zur Anschauung in den Nervenkanälen des Aetzbezirks, wenn die Kerne nicht gar zu

dicht aneinander gedrängt sind, als eine sehr feinkörnige Masse die sich in Goldchloridlösung sehr schwach rosa färbte, oder es ist gar keine Granulirung zu erkennen, und dann erscheint sie ungefärbt hell, heller als die Grundsubstanz, die collabirten Scheiden prall anfüllend, wie schon von Ranvier festgestellt worden. Nur so ist es zu erklären, wenn die durch die collabirte Scheide bedingte Zeichnung der blaffen feinen wellenförmigen Linien zwischen den Kernen verschwunden, vor dem der Mitte zunächst liegenden Kern jedoch noch zu sehen ist. . .

Dafs die Regenerationskerne vom Knotenpunkte aus zum Aetzbezirk hin fortbewegt, und nicht etwa in grofser Masse in loco gebildet werden, beweist die Beobachtung, dafs sie zuerst nur in nächster Nähe des Knotenpunktes auftreten, dann in den Nervencanälen am Rande des Aetzbezirks gesehen werden, bis sie schliesslich mit den von der entgegengesetzten Seite her in demselben Nervencanal entgegen ziehenden auf ungefähr halbem Wege zusammen stofsen. Hiebei sieht man in Canälen von stärkerem Lumen — dort wo die Kernfäulen auf einander stofsen — nur einen Kern, auch wohl 2 oder drei mit der Längsaxe in einer Linie liegende, während hinter diesem die Kerne, zu zwei, auch drei neben einander geordnet, das Lumen füllen. (Fig. VI.)

Ueberhaupt ist die Anordnung der Regenerationskerne, auch dort, wo sie nur einzeln vorkommen, in den Nervencanälen eine derartige, dafs sie mit ihrer Längsaxe parallel der Längsaxe des Canals liegen. (Fig. VIII.) Macht der Canal irgend wo eine scharfe Biegung, so macht der Kern, falls er an einer solchen Stelle zu liegen kommt, die Biegung mit, wobei er ein wenig in die Länge gezogen erscheint. Solche Krümmungen des Kerns beobachtet man am häufigsten dort, wo ein kleiner Nervencanal sich von dem gröfseren abzweigt; ist der Kern dann durch den Protoplasmastrom in den Nebencanal hineingeschwemmt, so erhält er seine normale Gestalt wieder; wenigstens sehen die Kerne in den Abzweigungen genau so aus, wie im Hauptcanal. Diese

Fortbewegung der Kerne dauert, wie aus den gleich zu beschreibenden Bildern geschlossen werden muß, so lange fort, bis sie auf ein Hinderniß stoßen, also 1) bis sie mit den von der gegenüberliegenden Seite des Aetzbezirks entgegenströmenden zusammen treffen, in diesem Falle legen sich die Spitzen der Säulen aneinander, das Lumen vollständig ausfüllend. 2) bis sie an einen Haufen von zusammengeballtem, den Canal verlegendem Detritus stoßen, hier stockt der Strom, oder es gelingt einem Kerne an dem Haufen vorbei zu kommen, wo dann ein zweiter nachfolgt u. s. w. — was an der Anhäufung vor dem Haufen, und dem spärlichen Vorhandensein dahinter kenntlich ist; 3) bis der Canal für die Passage des Kernes zu eng wird, wo der zuerst anlangende Kern lang ausgezogen, gekrümmt oder geknickt erscheint; endlich 4) bis der Nervencanal zu Ende ist. Ich habe schon bei der Besprechung der Degeneration darauf hingewiesen, daß es Fälle giebt, in denen die Nervenscheide durch die Aetzung zerstört wird; wahrscheinlich durch denselben Eingriff wird eine solche Veränderung in der Grundsubstanz gesetzt, daß auch der Nervencanal verödet; die Bilder sind gar nicht so selten, die ein plötzliches Aufhören der Canalcontouren zugleich mit denen der Ieren Scheide zeigen. Bestätigt wird diese Annahme durch das Verhalten der Kerne, sobald sie in einen solchen obliterirten Canal gelangen: nachdem in ihm die Kerne, wie auch sonst, mehr weniger dicht hintereinander gefolgt waren, sieht man gewöhnlich einen mit seiner Längsaxe senkrecht zur Längsaxe des Canals stehn, wohl auch gebogen oder geknickt, hinter ihm aber weiter in den Aetzbezirk hinein keine Spur von Contourenzeichnung, sondern nur homogene Grundsubstanz. Es kommt auch vor, daß man an einer solchen Stelle ein wüstes Durcheinander von Kernen und Kerntrümmern findet, und zwar in einem Umfange, dessen Durchmesser den des Canals bedeutend überragt. Hier muß man annehmen, daß der Canal sich an seinem Ende kolbenförmig, vielleicht durch Narbenschrumpfung, ausgeweitet hat, wenn man nicht zulassen will, daß die,

wie wir gesehen haben, weichen, umfangreichen Kerne sich einen Weg in die Grundsubstanz hinein zu bohren versucht haben, was ich für unwahrscheinlich halte.

Wo die Scheiden von den Kernen prall ausgedehnt werden, so daß der Nervencanal breiter als in der Randzone erscheint, beobachtet man zu beiden Seiten desselben feine kurze ($4-9\ \mu$) senkrecht zu einander stehende, sich dunkelfärbende Striche; daß diese Striche mit den Kernen nicht im Zusammenhang stehen, beweist die Stellschraube, die diese Striche, zum großen Teile wenigstens, über und unter dem Nervencanal liegend zeigt. Man gewinnt den Eindruck, als wenn die übermäßige Füllung des Nervencanals die umliegenden Interfascicularlücken auseinander gedrängt und diese sich dann mit einer, die Goldfärbung annehmenden, Substanz gefüllt hätten. Was für eine Substanz diese sein könnte, ist mir nicht klar geworden. Wanderzellen waren es jedenfalls nicht. (Fig. VI. b.)

Von den eben besprochenen Zeichnungen wohl zu unterscheiden sind im Beginne ziemlich ähnliche, die aber sowol mit der Scheide als auch mit den Kernen in unlcugbarem Zusammenhang stehen. Hier sieht man neben einem Kern aus der ihm zur Seite liegenden Scheide einen scheinbar soliden Zapfen, scharf contourirt, mit breiterer Basis und spitzigem freien Ende, in die Grundsubstanz seitlich vom Nervencanal hineinragen. In einem anderen Bilde erscheint dieser Zapfen größer (breiter und länger), dichotomisch geteilt; in einem späteren Bilde sieht man schon dichotomische Teilung der Zweige desselben, so daß eine hirschweihähnliche Bildung vorliegt; schließlich erscheinen in ihr Regenerationskerne, was auf ein Hohlwerden derselben schließen läßt. Ich stehe nicht an, solche Zeichnungen als Bildungen von Nervenscheiden zu deuten, und in dem ganzen Vorgange eine formative Tätigkeit der Regenerationskerne zu sehen. (Fig. IX.)

Alles bisher über die Wucherung und das sonstige Verhalten der Kerne gesagte gilt für Hornhäute, an denen die Aetzung

gelungen war. Dieselben Kerne finden sich auch an zu stark geätzten Hornhäuten, doch ist hier ihre Zahl gemeinhin eine viel geringere, man sieht sie nie in solchen Massen; auch kommen sie, wegen der gewöhnlich sehr dunklen Färbung, erst an gespaltenen Hornhäuten zur Anschauung. Dafür sind solche Hornhäute von Wanderzellen*) überschwemmt. (Fig. VII.) Ist die Infiltration mit Wanderzellen jedoch nur eine partielle, so sieht man an dem von ihnen frei gebliebenen Teile der Hornhaut die Regenerationskerne wie nach gelungener Aetzung sich entwickeln, in die Nervenbahnen hinein gelangen u. s. w. Ueberhaupt scheint die Gegenwart der Wanderzellen die der Regenerationskerne zu beschränken, wenn nicht auszuschließen.

Die Kernwucherung erreicht ihre Höhe mit dem Ende der dritten Woche (bei Winterfröschen; bei Frühjahrsfröschen ist sie überhaupt geringer). Später werden wahrscheinlich keine mehr gebildet, da von der vierten Woche an keine Teilungsfiguren mehr beobachtet werden. Bei den im Verlaufe des zweiten Monats zur Untersuchung kommenden Präparaten wird die Menge der Regenerationskerne stetig geringer, ohne daß es gelänge, die Art und Weise des Verschwindens nachzuweisen. In einigen sehr wenigen Präparaten glaubte ich Kerntrümmer zu sehen; es war aber nicht möglich, sich eine Ansicht darüber zu bilden, wodurch die Kerne zerfallen waren. Dagegen habe ich im zweiten Monate oft Bilder gesehen, in denen neben wol characterisirten Regenerationskernen die ovale Form in die Spindelform überging, während die Granulirung noch dieselbe blieb; und neben letzteren der Spindelform sich nähernde mit gröberer Granulirung, die kaum noch von normalen Kernen zu unterscheiden waren, was auf einen Uebergang der Regenerationskerne in die normalen hinweist.

Noch eines Vorganges will ich erwähnen, dessen Beschreibung bis jetzt, so viel ich weiß, noch nicht geliefert ist: gegen Ende

*) Ich gebrauche diese Benennung hier ohne Präjudiz.

des zweiten Monats begegnet man oft Kernen, die vollständig dem Typus normaler haben, nur ein wenig kleiner sind; diese sind von einem hellen Hof umgeben, den ein Contour einschliesst, der genau die Grösse und Form eines Regenerationskerns hat; zuweilen ist dieser Contour an einigen Stellen durchbrochen. Ob diese Bildungen zu wirklichen Scheidenkernen werden, ob an ihrer Stelle früher Regenerationskerne gelegen waren, ob überhaupt diese Bilder einen Uebergang der Regenerationskerne zu den normalen Scheidenkernen darstellen, wage ich nicht zu entscheiden. Fig. XII gibt ein solches Bild.

Mit der zweiten Hälfte des dritten Monats sieht man die wenigen noch sichtbaren Regenerationskerne höchst sonderbare Gestalten annehmen. Sie werden verkrümmt, verbogen, eckig, zackig; zeigen Vacuolen. Dann verschwinden sie, man sieht nur noch normale Kerne und zwar nicht mehr, als in einer normalen Cornea. Ich wende mich nun zur Besprechung der **Regeneration** der Nervenfasern.

Es lag im ursprünglichen Plan der Arbeit, die Nerven durch Aetzung zu zerstören, um dann an dem heil gebliebenen Stumpfe die sich abspielenden Vorgänge zu beobachten. Ich glaube, im Verlaufe der vorhergehenden Beschreibung klar gemacht zu haben, wodurch eine solche Betrachtung erschwert wurde; erwägt man ferner die grosse Feinheit der einzelnen, die Cornealnerven zusammensetzenden Fasern, so wird es erklärlich erscheinen, dass es mir nicht gelungen ist, die Vorgänge am Stumpfe des Nerven zu beobachten, dass ich vielmehr mich habe damit begnügen müssen, aus dem im klaren Aetzbezirk sich darstellenden Bildern Schlüsse auf die Vorgänge im Stumpfe zu ziehen.

Schon am 5.—6. Tage, zu einer Zeit, in welcher noch von keinem der früheren Beobachter eine Regeneration gefehnt worden, habe ich deutlich charakterisirte variköse Fasern, allerdings nur sehr kurze, innerhalb des Aetzbezirks gesehen, die nicht im Nervencanal verliefen, sondern ihren Weg ausserhalb desselben nahmen, wenn auch ungefähr dieselbe Richtung einschlagend. Da diese

Fasern ziemlich nahe der Membrana Descemeti verliefen, so war es leicht, sie auch bei sehr intensiver Färbung der Reizungszone centralwärts zu verfolgen: man sah sie entweder geradlinig verlaufen, oder eine bayonettförmige Knickung machen, und dann im nächstliegenden Nervenstamm, vor oder hinter dem Knotenpunkt, sich einer der im Stamme verlaufenden Fasern anlegen und mit ihr verschmelzen, ohne dafs an dieser Stelle etwas auffallendes wahrzunehmen⁷ gewesen wäre.

Dafs die früheren Beobachter ein so frühes Auswachsen der Primitivfibrillen nicht angeben, erklärt sich gewifs zum Teil daraus, dafs sie es mit Objecten zu tun hatten, die eine vorhergehende Zerfaferung nötig machten, bei welcher eine Primitivfibrille leicht dislocirt, wenn nicht gar abgerissen werden konnte, zum andern Teil daraus, dafs sie ihre Aufmerksamkeit auf das Gros der Regeneration gerichtet hatten, das erfahrungsgemäfs erst später auftritt. Der früheste bisher beobachtete Termin für den Eintritt der Regeneration ist der 12. Tag, wie Neumann³⁰ nach seinen Untersuchungen an Sommerfröschen gefunden. Auch ich habe um dieselbe Zeit in den Nervenbahnen Bilder gesehen, die mit denen der blassen Nervenfasern des gefärbten Froschmesenteriums durchaus identisch waren: schmale, blass rosa gefärbte Bänder, deren Granulirung eine, wenn auch nicht regelmäfsige, so doch entschieden ausgesprochene Längstreifung zeigte. Diese Bänder hatten meist parallele Ränder, doch kamen auch wohl Anschwellungen in denselben vor. Gewöhnlich hielten sie sich an eine Seite des Nervencanals, doch konnte man sie auch in der Mitte desselben beobachten. In späterer Zeit sah man wohl auch an ihrem freien Ende eine feine Faser ansetzen, die den Nervencanal verlief und dann sich in zwei oder mehrere variköse Fasern teilte. Am deutlichsten waren sie, wenn der Canal nur wenig Kerne enthielt; die Anwesenheit vieler dicht aneinander gelagerter Kerne verdeckte ihren Verlauf und oft waren sie durch dieselben vollständig unsichtbar gemacht.

An einem Sommerfrosch sah ich 12 Tage nach der Aetzung den Nervencanal, der ein beträchtliches Stück in den Aetzbezirk hinein ragte, von vollständig normalen Nervenfasern erfüllt, die wie an einem normalen Nerven, unter einander Fäden austauschten, um endlich alle zusammen auszulaufen in eine ziemlich stark granulirte zusammenhängende Masse, aus der dann eine große Menge von Fasern hervorwuchs die sich nach den verschiedensten Richtungen ausbreiteten, teilweise mit einander wieder verschmolzen, wiederum auseinander strahlten und endlich in eine große Menge von varikösen Fäden sich teilten. (Fig. V.)

A. Trotz genauester Untersuchung gelang es mir nicht, in dem klaren Aetzbezirk auch nur eine Spur von Scheidencontouren oder Canalzeichnungen zu entdecken, der Nervencanal sammt den Scheiden war also im weiteren Verlauf verödet. Der in den Aetzbezirk hineinragende Stamm besaß in seinem ganzen Verlauf nur einen Kern, der von normaler Größe, Form und Granulirung war, jedoch helle Färbung zeigte; die aus dem freieren Ende auswachsenden Aeste und deren Verzweigungen waren entschieden nackt. Dort wo zwei Aeste sich an einander legten, sah man das eigenthümliche, schon im ersten Theil der Arbeit beschriebene Bild, daß die vorher tief dunkel gefärbten Aeste nach ihrer Verschmelzung bedeutend heller wurden und Granulirung zeigten, so daß sie leicht einen zwischen zwei Fasern liegenden Kern vortäuschen konnten, wenn nicht dieser Stelle ein wesentliches Attribut des Kernes, der scharfe Contour gefehlt hätte. (Bei späteren Stadien der Untersuchungen ist mir dann häufig dasselbe Bild begegnet, daß nämlich dunkle, schmale Fasern, nach ihrer Vereinigung zu einem breiten Bändchen, sofort eine hellere Färbung zeigten.) Ich habe mir bei Betrachtung dieses Präparates die Frage vorgelegt, ob der in den Aetzbezirk hineinragende Stamm nicht vielleicht doch als aus alten Fasern bestehend gedacht werden müßte? Der einem normalen so ähnliche Kern, die vollständige Ausbildung der Fasern in so kurzer Zeit legten die Ver-

nutzung nahe, daß hier die früheren Fasern auf irgend eine Weise vor der Aetzung geschützt worden wären. Die Erwägung jedoch, daß die Nerven unmöglich hätten intact bleiben können, wenn nicht neben ihnen das Aetzmittel so stark gewirkt, daß sogar die Scheiden zerstört waren, führte mich zu dem Schluss, daß hier ein Fall von vollständiger Regeneration vorläge.

Der eben besprochene muß übrigens als ein Fall von ausnehmend früher Regeneration angesehen werden. Gewöhnlich erhielt ich solche Bilder erst in der dritten, bei Winterfröschen sogar erst in der vierten Woche. So liegt mir ein Präparat vor, 26 Tage nach der Aetzung, in welchem der normale Nerv bis hart an den Aetzbezirk verläuft, dort in ein homogenes, dunkel gefärbtes kurzes Stämmchen übergeht, das sich in drei Ästchen teilt, von denen aus jedem wieder eine Unzahl variköser Fäden pinselförmig auswachsen. Dieses Präparat ist noch dadurch interessant, daß durch einen anderen Abschnitt des Aetzbezirks ein Nervencanal verläuft, der eine große Menge von Regenerationskernen zeigt, neben denen regenerierte Nervenfasern nicht erkennbar sind, dagegen sind die Contouren des Nervencanals deutlich sichtbar, während derjenige Nerv, der das Auswachsen der Primitivfibrillen zeigte, im Aetzbezirk keine Fortsetzung in Gestalt von Scheidencontouren oder Canalzeichnung hatte. Fig. X.

Ich muß mich hier vor dem Einwand schützen, als hätte ich Spiefse für Primitivfibrillen angesehen. Schon Boettcher hat auf die Möglichkeit einer solchen Verwechslung aufmerksam gemacht. Sowol die Spiefse, als auch die Primitivfibrillen zeigen in ihrem Verlaufe Varicositäten, beide haben einen lang gestreckten Verlauf, beide erscheinen im goldgefärbten Präparat dunkel, fast schwarz, und doch unterscheiden sie sich sehr wesentlich von einander; die Spiefse sind gewöhnlich breiter als Primitivfibrillen, die Anordnung der Varicositäten ist an ihnen eine unregelmäßige, sowohl was die Größe, als auch die Entfernung derselben von einander betrifft, während die Varicositäten der Primitivfibrillen

mit fast mathematischer Genauigkeit dieselbe Spindelform in denselben Abständen von einander wiederkehrend zeigen: die Spiesse verlaufen stets schnurgerade, entsprechend der anatomischen Anordnung der Cornealfascikel, höchstens dann und wann eine bayonettförmige Ablenkung zeigend, die Primitivfibrillen, obgleich häufig genug denselben Verlauf nachahmend, halten doch gewöhnlich eine mehr geschwungene Richtung ein; die Spiesse verlaufen stets parallel, kreuzen sich unter rechtem Winkel in verschiedenen Gesichtsebenen, die Primitivfibrillen sind selten parallel, mit Vorliebe pinfel- oder baumförmig auseinander strahlend; kreuzen sich unter allen möglichen Winkeln und zumeist in derselben Gesichtsebene. Das Hauptkriterium jedoch für die Primitivfibrille, diese variköse Faser *κατ' ἐξοχήν*, ist ihr Ursprung aus einem Nervenstamm. (Fig. IX.).

Im weiteren Verlaufe der Beobachtung erhält man Bilder, in denen neben der grossen Menge aus einem Stumpfe auswachsender, einzeln verlaufender Fasern man auch solche sieht, die dicht nebeneinander verlaufen, entweder während des ganzen Verlaufes getrennt bleibend, oder während längerer oder kürzerer Strecken miteinander verschmelzend, um so eine breitere Faser zu bilden. Neben diesen breiteren Fasern treten dann wieder feinere auf, welche auf die so eben beschriebene Weise zu breiteren Fasern werden. Zuweilen erhält man den Eindruck, als ob die ursprünglich pinselförmig auseinander strahlenden Fasern sich mit ihren dem Centrum zugekehrten Ursprüngen an einander legen. Nicht alle Fasern der Pinfel- oder Baumfigur gestalten sich jedoch auf solche Weise zu mehr weniger starken Nerven, die Mehrzahl bleibt varikös; während nun die ersteren bei ihrem weiteren Längswachstum mehr eine gerade, dem entgegengesetzten Rande der Cornea zustrebende Richtung einschlagen, nehmen die varicöses bleibenden Fasern einen mehr geschwungenen Verlauf an. Indem die stärkeren Nerven sich ausbilden, der Breite sowohl, als auch der Länge nach, teilen sich von ihnen seitlich Zweige ab, die

wieder Theilungen eingehen, bis aus ihnen schliesslich nur varicöse Fasern hervorgehen, die mit den langen varicösen Fasern, und auch unter sich Anastomosen eingehen. Auch an den abgezweigten Nerven wiederholt sich derselbe Process des Wachstums. Zu Anfang des dritten Monats endlich sieht man die vielfach sich verzweigenden, regenerirten Cornealnerven, die sich nur dadurch von einem normalen unterscheiden, dass ihre Aeste und Zweige nur unter einander anastomosiren, nicht aber mit den Verzweigungen eines anderen, mittlerweile sich ebenso regenerirt habenden Nerven. Wir haben also, statt des ursprünglichen, zierlichen Nervennetzes mehrere (2—3) baumförmige, vollständig von einander getrennte, in verschiedenen Gesichtsebenen liegende Figuren. Bemerkenswert ist hierbei die überwiegende Entwicklung eines Nerven im Verhältniss zu den andern, welche nicht dieselbe Grösse erreichen. Gegen die Mitte des dritten Monats sieht man Zweige solcher Figuren unter einander anastomosiren. Zu Ende des dritten Monats sind die Anastomosen vollständig ausgebildet, und eine solche Cornea unterscheidet sich von einer normalen — abgesehen von der noch immer geringeren Zahl der Hornhautzellen in der Gegend des Aetzbezirks — nur dadurch, dass die interfibrilläre Kittsubstanz der Nerven an den neugebildeten Fasern zu fehlen scheint; denn auch die Kerne sind in normaler Anzahl und Gestalt vorhanden, und zwar sind dieselben schon in der Mitte des zweiten Monats aufgetreten, zuerst central, dann immer weiter peripherisch erscheinend. Die Kerne und die dazu gehörigen Scheiden müssen sich hier in loco gebildet haben, denn während des ganzen Processes ist nie ein Regenerationskern, aus dem sie sich entwickelt haben könnten, in der Nähe der sich regenerirenden Nerven gesehen worden; ebenso wenig Wanderzellen.

Der Regenerationsprocess an Nerven, deren Scheide und Nervencanal im Aetzbezirk sich erhalten hat, unterscheidet sich von dem soeben beschriebenen dadurch, dass in den von den Regenerationskernen gleichsam, wie von einem Endothele ausge-

B.

kleinsten Nervencanalen sich von Anfang an breitere Nervenfasern hinzugeben und zwar ebenfalls einzeln, so daß zuerst nur ein kleines Bündchen innerhalb des Nervencanals sichtbar wird, dann ein zweites und so fort, bis der Canal ausgefüllt ist. Die ersten solcher Fasern sieht man bei Sommerfröschen am Ende der zweiten Woche, bei Winterfröschen in der vierten. Eigentümlich ist, daß keine lineare oder gar variciöse Fasern außerst selten in den Nervencanalen beobachtet werden: man sieht solche vielmehr ausserhalb der Nervencanäle, von deren Seiten sie unter einem zur Mitte der Hornhaut offenen Winkel in die Grundsubstanz treten. Waren die Seitencanäle erhalten, so sieht man auch diese breitere Nervenfasern annehmen, ebenso die neugebildeten Scheiden: die feinsten Verzweigungen werden auch hier durch Auswachsen der Axencylinder gebildet. Ein weiterer Unterschied besteht in der Bildung der Kerne aus den Regenerationskernen, wovon schon oben gesprochen ist.

C. Hornhäute mit verodeten Nervencanalen und den darauf folgenden Regenerationsproceß beobachtete ich in überwiegender Anzahl an Sommerfröschen, dagegen waren bei Winterfröschen die Nervencanäle gewöhnlich erhalten. Ich erkläre mir dieses aus der größeren Torpidität der Winterfrösche, bei welcher auch ein stärkerer Reiz nicht diejenige Reaction hervorruft, welche bei einem lebenskräftigeren Individuum schon ein schwächerer Reiz auslöst. Aus demselben Grunde wohl fand ich bei Sommerfröschen die Hornhaut viel häufiger perforirt. An solchen Hornhäuten, die meist von Wanderingellen überschwemmt waren, sah ich die Nervencanäle fast immer bis an den Gleichwursrand heran reichen, konnte nur aber über deren Inhalt nur selten Gewißheit verschaffen. Nach Spaltung der Hornhaut stellten sie sich als mit dunklen gröbkörnigen Massen angefüllt dar, oder sie schienen in großen Mengen Wanderingellen zu enthalten: am Cornealrande war dagegen häufig noch normale Faserung mit normalen Kernen.

Ein fast constanter Befund an perforirten Hornhäuten während des zweiten und dritten Monats waren variciöse Fasern, die

die bis an den Geschwürsrand heranreichten, nach rückwärts aber sich nicht immer bis zum Nerven verfolgen ließen, sondern selbst in bedeutender Entfernung von ihm, zumal wenn er von Wanderzellen überschwemmt war, am Cornealrand auftauchten. Wahrscheinlich stammten sie aus den Scleralnerven. War dagegen die Anzahl der Wanderzellen keine übermäßige, so sah man dieselben Bilder, wie sie oben beschrieben; auch hier waren constant am Geschwürsrande endende, variköse Fasern zu finden.

In Nervenkanälen recht klarer Aetzbezirke, besonders den schmäleren, sieht man oft 2—3 Regenerationskerne, mit ihren Längsaxen in derselben Linie, in einiger Entfernung von einander von einem feinkörnigen, sich blafsrosa farbenden Protoplasma umgeben; der Enge des Canals entsprechend ist das Protoplasma an den Längsseiten weniger reichlich, als an den Spitzen, wo es sich nach beiden Seiten hin fein auszieht, bis es mit dem Protoplasma des nächstgelegenen Kernes zusammenfließt. Wol solche Bilder sind es gewesen, die viele Autoren bewogen haben, die Entstehung der neuen Fasern durch Verschmelzung von Zellen zu erklären. Tritt nun noch zu einem Ende einer solchen Kernreihe eine variköse Faser, wie es allerdings nicht selten gesehen wird, so liegt die weitere Deutung nahe, daß diese eine aus der neugebildeten Faser auswachsende Primitivfibrille sei. Nun ist es mir aber stets gelungen, solche Fibrillen zu einem unzweifelhaften, wohl charakterisirten Nervenstamm zurück zu leiten. Andererseits habe ich solche Kernreihen eben so oft im Zusammenhange mit zweifellosen Nervenfasern, als zweifellos sie recht weit entfernt von solchen gesehen. Falls im letzten Falle sich wirklich eine Faser aus dieser durch das Protoplasma zusammenhängenden Kernreihe bilden sollte, so wäre sie doch kaum als Axencylinder aufzufassen, denn es wäre nicht recht erfindlich, wie die Bildung eines solchen zu Stande kommen könnte, da, wie Rump f gezeigt hat, dieser vom Centrum getrennt, unrettbar der Resorption durch die Lymphe verfällt, derselbe also auch gleich im Entstehen gelöst werden

müßte. Ist die Reihe jedoch im Zusammenhang mit einem Nerven, so hätte der Vorgang eben weiter nichts zu bedeuten, als daß der auswachsende Axencylinder in dem die ovalen Kerne umgebenden Protoplasma sein Bildungsmaterial vorfindet. Es wäre also in diesem Falle nur eine Modification des sonst für die Regeneration der Nervenfafer beobachteten Vorganges, nämlich der Regeneration durch Auswachsen des Axencylinders. Wir hätten es hier also mit einer Wiederholung des entwickelungsgeschichtlichen Vorganges zu tun, der nach Kölliker³² darin besteht, daß die peripherischen Nerven aus den Centralorganen hervor sprossen, nicht aber in loco aus peripheren Zellen gebildet werden.

Die Ergebnisse dieser Arbeit fasse ich in folgenden Sätzen zusammen.

1. Die Degeneration der marklosen Nervenfasern erfolgt auf eine entzündliche Reizung hin, und besteht in körnigem, seltener fettigem Zerfall des Axencylinders und der Scheidenkerne.
2. Die Degeneration bleibt stets bei einem Knotenpunkt stehn, gewöhnlich dem der Reizungstelle zunächst, centralwärts von ihr, gelegen; sie schreitet in longitudinaler, nie in transversaler Richtung fort.
3. Degeneration und Regeneration sind zeitlich nicht aus einander zu halten, verlaufen vielmehr neben einander; was jedoch so aufzufassen ist, daß die Regeneration schon beginnt, bevor die Producte der Degeneration (durch Lösung, Resorption etc.) geschwunden sind.
4. Die Kernwucherung ist ein Product der entzündlichen Reizung; sie geht von den, im intact gebliebenen Knotenpunkt gelegen, Scheidenkernen aus.
5. Die Vermehrung der Kerne findet wahrscheinlich durch Teilung statt.
6. Die neugebildeten Kerne liefern eine (endotheliale) Auskleidung der alten Scheiden, geben den Anstoß zur Bildung neuer

Scheiden und werden schliesslich zu normalen Scheidenkernen. Der Ueberfchufs an Regenerationskernen geht zu Grunde; wie, ist nicht nachgewiesen.

7. Kernwucherung und Regeneration der Axencylinder stehn in keinem Zusammenhang; beide Proceffe verlaufen vollständig unabhängig von einander.

Zu den im Eingange des letzten Abschnittes angeführten Citaten aus den Arbeiten von Stricker, Thanhoffer und Tizzoni habe ich noch einige Bemerkungen hinzuzufügen.

Den von Stricker betonten Parallelismus zwischen den Teilungsformen des Axencylinders und der Hornhautkörper konnte ich nicht finden. Allerdings sah ich einige Male Bilder am Axencylinder, die der von Stricker gegebenen Abbildung durchaus glichen, doch war zugleich eine Teilung der Hornhautzellen nicht nachzuweisen. Solche Bilder erhielt ich in Corneen gleich oder 3—4 Tage nach der Aetzung getödteter Frösche und habe sie in meiner Arbeit mit der von Boll beschriebenen federfelenartigen Zeichnung verglichen, somit als Zerfetzungsbild des Axencylinders aufgefaßt.

Thanhoffer läßt die Nerven während der Entzündung durch Anhäufung von Wanderzellen und Kernwucherung verworren werden, und stellt dann eine Regeneration aus eigentümlichen, langgestreckten Zellen als wahrscheinlich auf. Dafs die Anhäufung von Wanderzellen kein notwendig eintretendes Ereignifs ist, glaube ich nachgewiesen zu haben. Ob er unter den eigentümlichen lange gestreckten Zellen die von Protoplasma umgebenden Regenerationskerne versteht, ist nicht klar. Andere, als diese habe ich nie beobachtet und was ich von ihrer Beteiligung bei der Regeneration halte, schon oben aus einander gesetzt.

Ich mufs Tizzoni widersprechen wenn er behauptet, die Untersuchung der Cornea im Humor aqueus gebe genauere Bilder.

Die Goldfärbung, wenn sie gelungen, ergiebt Bilder, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen, und wenn die Goldfärbung nicht gelang, so waren die Bilder in der lebenden Cornea — davon habe ich mich überzeugt — in der grossen Mehrzahl der Fälle auch nicht zu entziffern gewesen. Die von ihm beschriebene Regeneration aus Ueberresten des degenerirten Axencylinders habe ich nie beobachtet. In allem Uebrigen schliesse ich mich den Ausführungen Tizzoni's, so weit sie nicht schon früher berührt waren, rückhaltslos an; besonders freut es mich, dass auch von ihm die Regeneration durch Auswachsen des Axencylinders constatirt werden konnte.



1. Waller. *a.* Nouvelle méthode pour l'étude du système nerveux etc. Comptes rendus 1851. T. 33.
b. Nouvelles observations sur la régénération des nerfs. *ibid.* 1852. T. 34.
c. Examen des alterations qui ont lieu — par suite de la section des nerfs, *ibid.* 1853. T. 35.
d. Sur la reproduction des nerfs etc. *Muellers Arch.* 1852.
2. M. Schultze. *a.* Untersuchungen über den Bau der Nasenschleimhaut. *Abhandl. d. nat. Gefellsch. zu Halle.* 1862.
b. Observationes de structura gangliorum fibrarumque nervearum. *Bonn* 1868.
c. Allgemeines über die Structurelemente des Nervensystems. *Strickers Handbuch* 1871.
3. Waldeyer. Untersuchungen über den Ursprung und den Verlauf des Axencylinders. *Ztschrift. für rat. Med.* 1863. Band 20.
4. Ranvier. *a.* Contributions à l'histologie et à la physiologie des nerfs périphériques. *Comptes rendus* 1871. T. 73.
b. Recherches sur l'histologie et la physiologie des nerfs. *Archives de physiologie normale et pathologique.* T. IV. Mars 1872.
c. Leçons sur l'histologie du système nerveux. *Paris* 1878.
5. Tizzoni. Sulla patologia del tessuto nervoso. *Archivio par le scienze mediche.* 1878. vol. III.
Zur Pathologie des Nervengewebes. Vorläufige Mittheilung. Med. Centralblatt. 1878.
6. Waldeyer. Mikroskopische Anatomie der Cornea etc. *Handb. d. gef. Augenheilkunde von Graefe und Sämisch* Bd. I. 1874.
7. His. Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der Hornhaut. *Basel* 1856.

8. L e b e r. Ueber die Lymphwege der Hornhaut. Klin. Monatsblätter für Augenheilkunde. 1866. citirt nach Waldeyer (Nr. 6).
9. B e a l e. On the Anatomy of Nerve-fibres and cells, and the ultimate distribution of nerve-fibres. Ref. von Ciaccio in Quarterly Journal of Microsc. Sciences 1863. vol. III.
10. C i a c c i o. On the nerfs of the Cornea etc. Quarterly Journal of Micr. Sciences. 1863. vol. XI.
11. H o y e r. Ueber die Nerven der Hornhaut. M. Schultze's Archiv 1873. Bd. 9.
12. L a n g h a n s. Das Gewebe der Hornhaut im normalen und pathologischen Zustande. Ztschrift f. rat. Med. 1861. Bd. XII.
13. L a w d o w s k i. Das Saugadersystem und die Nerven der Cornea. M. Schultze's Archiv 1872 Bd. VIII.
14. T h a n h o f f e r. Beiträge zur Physiologie und Histologie des Auges. Virchow's Archiv 1875 Bd. 63.
15. K u e h n e. Untersuchung über das Protoplasma und die Contractilität. Leipzig 1864.
16. H e n l e. Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen 1866 Bd. 2.
17. C o h n h e i m. Ueber die Endigungen der sensiblen Nerven in der Hornhaut. Virchow's Archiv 1866. Bd. 38.
18. K ö l l i k e r. Handbuch der Gewebelehre des Menschen. 5. Auflage 1867.
19. S c h w e i g g e r - S e i d e l. Ueber die Grundsubstanz und die Zellen der Hornhaut des Auges. Arbeiten aus d. phys. Anst. zu Leipzig. 1869. 4. Jahrgang.
20. R o l l e t. Ueber die Hornhaut. Strickers Handbuch 1872.
21. K l e i n. On the peripheral distribution of non medullated nerve-fibres. Quart. journ. of micr. sc. 1871 XI. Oct. 1872. Jan.

22. Key und Retzius. Studien in der Anatomie des Nervensystems. 2. Hälfte, Stockholm 1876.
 23. Ewald und Kuehne. Ueber einen neuen Bestandtheil des Nervensystems. Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg. Neue Folge. Bd. I. 1875.
 24. Reifsnier. Neurologische Studien. Arch. für Anatomie, Physiologie etc. 1862.
 25. Boettcher. Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Eiterkörperchen bei der traumatischen Keratitis. Virch. Arch. Bd. 58. 1873.
 26. Güterbock P. Studien über die feineren Vorgänge bei der Wundheilung per primam intentionem an der Cornea. Virch. Arch. Bd. 50. 1870.
 27. Moseley. Some Remarks on the Nerves of the Cornea of the Rabbit and Frog. Quart. Journ. of Microsc. Sciences. 1871. T. XI.
 28. Rumpf. a. Zur Histologie der Nervenfa^vser und des Axencylinders. Untersuchung aus dem physiologischen Institut der Universität Heidelberg Bd. II. Heft 2. 1878.
b. Zur Degeneration durchschnittener Nerven. ibidem Bd. II. Heft 3. 1878.
 29. Boll. Ueber Zersetzungsbilder der markhaltigen Nervenfasern. Archiv für Anatomie und Physiologie Anat. Abt. 1877.
 30. Neumann. Ueber Degeneration und Regeneration zerquetschter Nerven. M. Schulze's Archiv Bd. 18. 1880.
 31. Colofanti. Ueber die Degeneration durchschnittener Nerven. Archiv für Anat. und Physiol. Physiologische Abt. 1878.
 32. Kölliker. Entwicklungsge^schichte des Menschen und der höheren Wirbelthiere. 2. Aufl. 1879.
-

Verzeichniss der Abbildungen.

- Fig. I. Stück eines normalen Cornealnerven. (pag. 4).
- Fig. II. Präparat vom 28. März, 2 Tage nach der Aetzung (Kali 60"). Körniger Zerfall der Nervenfasern und Scheidenkerne innerhalb des Aetzbezirks. a. Grenzlinie zwischen Aetzbezirk und normaler Hornhaut. (pag. 43).
- Fig. III. Präp. v. 1. Juli, 2 Tage n. d. Aetzung (Kali 45"). Wanderzellen, einen der Nervenfasern beraubten Nervencanal dichtgedrängt erfüllend. a. wie oben. b. einzelne Wanderzellen, der Mitte des Aetzbezirks näher liegend. (pag. 46).
- Fig. IV. Präparat v. 8. Novbr., 3 Tage n. d. Aetzung (Chlorzink 30"). Körniger Zerfall. a. wie oben. (pag. 43).
- Fig. V. Präparat vom 11. Juni, 12 Tage nach der Aetzung (Kali 45"). Regenerirter Nervenstamm innerhalb des im Aetzbezirk erhaltenen Nervencanals. a. wie oben. b. Ende des Nervencanals. c. normaler Kern, blasförmig. Zwischen b. und c. nur einzelne Fasern in einer körnigen Masse, aus welcher 6 stärkere Fortsätze auswachsen, die nach kurzem Verlaufe in varikösen Fasern endigen. Letztere sind nicht ausgeführt, nur bei d. angedeutet. (pag. 64).
- Fig. VI. Präp. v. 9. April, 14 Tage n. d. Aetzung (Kali 60"). Nervencanal im Aetzbezirk, von reihenweise angeordneten Regenerationskernen angefüllt, in der Mitte die Kerne in einer Reihe, nur bei b. sind die senkrecht aufeinander stehenden kurzen Linien ausgeführt, die den Canal mit Ausnahme des Mittelstückes von allen Seiten umgeben. (pag. 58, 60).
- Fig. VII. Präp. v. 11. April, 16 Tage n. d. Aetzung (Kali 60"). Nervencanal im Aetzbezirk, Wanderzellen enthaltend,

die sich in reichlicher Menge auch in der Grundsubstanz finden. (pag. 61).

Fig. VIII. Präp. v. 15. Juni, 16 Tage n. d. Aetzung (Kali 45"). Nervencanal im Aetzbezirk, Regenerationskerne und körniges Protoplasma enthaltend. Keine Faserung, x Kernteilungsfigur. (pag. 58).

Fig. IX. Präp. v. 23. März, 23 Tage n. d. Aetzung (Kali 60"). Bild aus dem Aetzbezirk, variköse Fasern und Spiefse neben einander zeigend, letztere in verschiedenen Ebenen gelagert (pag. 66).

Fig. X. Präp. v. 15. Febr., 25 Tage n. d. Aetzung (Kali 45"). Freihandzeichnung. Heller Aetzbezirk innerhalb der dunkleren Reizungszone. N, N von der Cornealperipherie her zur Grenze des Aetzbezirks ziehende Nervenstämmchen, von denen die oberen das Auswachsen der Primitivfibrillen zeigen. K. Knotenpunkt des alten Nerven, von da an keine Spur eines Nervencanals. Der unten eintretende Nerv zeigt keine Fasern, sondern nur innerhalb des wohl characterisirten, erhaltenen Canals Regenerationskerne (pag. 65).

Fig. XI. Präp. v. 4. April, 35 Tage n. d. Aetzung (Kali 50"). Bild aus dem Aetzbezirk, Regeneration innerhalb eines erhaltenen Nervencanals, a. wie oben, von a. bis b. regenerirte Nervenfasern neben Regenerationskernen, von b. bis e. nur letztere, d. e. zapfenförm. Auswüchse (pg. 60).

Fig. XII. Präparat vom 4. Juli, 71 Tage nach der Aetzung (Chlorzink 45"). Stück eines regenerirten Nerven nebst Kernen. (pag. 62).

Sämmtliche Abbildungen, mit Ausnahme der Fig. X, die Freihandzeichnung ist, sind mit Hülfe der Camera lucida, Hrtn. Syst. 7. eingeschobener Tubus, angefertigt worden.

T H E S E N.

1. Es gibt keinen principiellen Unterschied zwischen den peripherischen vegetativen und sympathischen Nerven.
2. Für die Reverdin'sche Dermatoplastik ist eine ad hoc ausgeführte Excision aus der Haut des Patienten zu verwerfen.
3. Die einzig rationelle Impfmethode für die Landpraxis ist die Laïschew'sche. (Лаишевскій способъ оспопрививанія.)
4. Die von den Aerzten bei der Einberufung vorschriftsmäßig geführten Listen enthalten ein der Ausbeutung harrendes, für die Statistik der Landeshygieine unschätzbares Material.
5. Die temporären Kriegshospitäler sind durch Lazarete zu ersetzen.
6. Die topographisch - anatomischen Bezeichnungen »medial«, »lateral«, »vorn«, »hinten« sind bei der Beschreibung des Armes als sinnverwirrend zu verwerfen.




Fig. I.



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.

1714
81